




المملكة العربية السعودية
المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج

$$\det(C) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 4 - 6 = -2 \neq 0$$

$$(3x^2 + 6x - 4) + (4x^2 - 5x + 3) \quad 2)$$



تخصص محاسبة

رياضيات تخصصية

111 رياض

طبعة ١٤٢٩ هـ

مقدمة

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد وعلى آله وصحبه، وبعد:

تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل، ويأتي هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب في مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاتياً على موارده وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدماً في دفع عجلة التقدم التتموي: لتصل بعون الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة صناعياً.

وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة في بناء البرامج التدريبية، وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته لتلبي متطلباته، وقد تمثلت هذه الخطوة في مشروع إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيزة الأساسية في بناء البرامج التدريبية، إذ تعتمد المعايير في بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي تفرضه متطلبات سوق العمل، لتخرج هذه اللجان في النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر التصاقاً بسوق العمل، وأكثر واقعية في تحقيق متطلباته الأساسية.

وتتناول هذه الحقيبة التدريبية "رياضيات تخصصية" لمتدربي معاهد التدريب العسكري المهني موضوعات حيوية تتناول كيفية اكتساب المهارات اللازمة لهذا التخصص.

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هذه الحقيبة التدريبية تأمل من الله عز وجل أن تسهم بشكل مباشر في تأصيل المهارات الضرورية اللازمة، بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد، وبالإستعانة بالتطبيقات والأشكال التي تدعم عملية اكتساب هذه المهارات.

والله نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب

الدعاء.

تمهيد

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله رائد البشرية ومعلمها الأول، ورحمة الله المهداة إليها، لتخرج به من الظلمات إلى النور، وعلى من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد.

فإن مقرر رياضيات تخصصية - 1 يهدف إلى تقديم وثيقة أساسية موجهة لطلبة قسم الإدارة لتعليم الطالب المهارات الأساسية لعدد من المواضيع الرياضية التي تؤهله لفهم المقررات التخصصية. ولقد ظهر إلينا خدمة للأهداف التربوية إعطاء بعض التفاصيل للنتائج الأساسية والتي يحتاج إليها الطالب في التطبيقات المباشرة دون التعمق في المسائل النظرية حرصاً منا على إيصال المعلومة الواضحة للطالب مع الحرص على الإكثار من حل الأمثلة والمسائل المباشرة والتي يمكن أن يتعرض لها الطالب في مواد التخصص ليتسنى له فهمها بوضوح. لقد تم تحرير حلول الأمثلة بدقة وكان الشاغل الرئيسي هو تعويد الطالب استيعاب القوانين الأساسية للرياضيات وتمكنه من كيفية استعمالها في مسائل مختلفة لرفع من مهاراته وقدراته ومنهجيته في تحرير الحلول والربط بين هذه القوانين والمسائل التطبيقية. ودراسة هذا المقرر ستمكن الطالب من:

- الإلمام بمفهوم المجموعات والعمليات عليها و معرفة نظم الأعداد والعمليات عليها
- كيفية تحليل كثيرات الحدود والإلمام بطرق حل المعادلات ذات مجهول واحد من الدرجة الأولى و الثانية

- الإلمام بفهم واستخدام الأسس واللوغاريتمات
- معرفة مفهوم الدالة وكيفية رسم بعض الدوال المشهورة بيانياً
- الإلمام بفهم المتتابعات والمتسلسلات
- معرفة القواعد الأساسية لطرق العد

ولتحقيق هذه الأهداف بإذن الله تعالى فقد قسمت هذه الحقيبة التدريبية إلى خمسة وحدات رئيسية: تعنى الوحدة الأولى لتعريف الطالب بأساسيات الرياضيات في مفهوم المجموعات والعمليات عليها والتمكن من العمليات الحسابية على مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد الحقيقية وتحديد الفترات. فيتوجب على طالب قسم الإدارة أن يلم بهذه المواضيع. وتهدف هذه الوحدة إلى تحقيق هذا الغرض وقد قسمت إلى فصلين

في الفصل الأول نتطرق إلى تعريف المجموعة وخصائصها، العمليات على المجموعات (تقاطع- اتحاد - فرق) كما نتطرق إلى متممة المجموعة وقانون ديمورغان.

وفي الفصل الثاني نتعرض إلى تعريف مجموعة الأعداد والعمليات الحسابية على مجموعة الأعداد النسبية ومجموعة الأعداد الحقيقية. وكيفية تحديد الفترات.

و خصصت الوحدة الثانية لدراسة مفهوم كثيرات الحدود والعمليات الحسابية عليها كما نتطرق لكيفية تحليل كثيرات الحدود بطرق مختلفة وقد قسمت هذه الوحدة إلى فصلين

في الفصل الأول ندرس كثيرات الحدود والعمليات عليها وكيفية تحليلها بطرق مختلفة منها طريقة العامل المشترك وطريقة استخدام القانون العام و إكمال المربع.

وفي الفصل الثاني نتطرق إلى معنى وكيفية حل المعادلات من الدرجة الأولى والثانية

أما الوحدة الثالثة فتهدف لمعرفة الطالب بمفهوم الأسس واللوغاريتمات ولهذا الغرض تطرقنا للقواعد العامة للأسس والقوانين الأساسية للوغاريتمات كما تطرقنا لطرق حل المعادلات التي تحتوي على الأسس أو اللوغاريتمات.

والوحدة الرابعة خصصت لدراسة مفهوم الدوال والتعريف بمجال ومدى الدوال وكيفية تحديدهما كما نبين في هذه الوحدة كيفية رسم منحنى بعض الدوال المشهورة.

أما الوحدة الخامسة والأخيرة فتهدف لمعرفة الطالب المعاني العامة للمتتابعات والمتسلسلات وكيفية حساب الأوساط الحسابية والهندسية للمتتابعات والحد العام لها وقوانين حساب المجموع الجزئي للمتسلسلات المنتهية الحسابية والهندسية. كما تهدف لتعريف الطالب بأساسيات طرق العد ومفهوم التباديل والتوافيق وكيفية استعمالاتها، ومعرفة قانون ثنائي الحد وكيفية استخدامه. ويتوجب على طالب قسم الإدارة أن يلم بهذه المواضيع. وتهدف هذه الوحدة إلى تحقيق هذا الغرض، وقد قسمت إلى فصلين: فصل المتتابعات والمتسلسلات ، وفصل طرق العد.

في الفصل الأول نتطرق إلى معنى المتتابعات المنتهية و الا منتهية معرفة الحد العام للمتتابعات، وحساب الأوساط الحسابية والهندسية كما نتطرق إلى مفهوم المتسلسلات الحسابية والهندسية المنتهية وكيفية حساب المجموع الجزئي لها.

في الفصل الثاني نذكر القاعدة الأساسية لطرق العد ونتطرق إلى مفهوم التباديل و التوافيق والعلاقة بينهما وخصائصهما كما نشرح مجالات استعمالاتها في طرق العد. وأخيرا نتعرض إلى قانون ثنائي الحد وخصائصه وكيفية استعماله.

والله الموفق

رياضيات تخصصية

المجموعات

اسم الوحدة: المجموعات

الجدارة: الإلمام بفهوم المجموعات ونظم الأعداد

الأهداف:

بعد دراسة هذه الوحدة يكون للطالب القدرة على معرفة:

- تعريف المجموعات وتحديد خصائصها.
- اجراء العمليات الحسابية على المجموعات.
- اجراء العمليات الحسابية على مجموعة الأعداد النسبية.
- ايجاد القيم المطلقة وتحديد الفترات.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة 80% .

الوقت المتوقع للتدريب:

سنة ساعات للفصل الأول و ستة ساعات للفصل الثاني، بحيث يكون الوقت الكلي اثنا عشر

ساعة .

الفصل الأول: المجموعات

1. تعريف المجموعة

نعرف المجموعة رياضياً أو منطقياً بأنها أي تجمع أو تكتل من الأشياء الحسية أو المعنوية التي يمكن تمييزها عن غيرها بمعيار دقيق وقاطع متفق عليه. فمثلاً لتكن المجموعات التالية:

- أ- مجموعة الأعداد 2, 4, 6, 8, 10.
- ب- مجموعة الاثني عشر شهراً في السنة.
- ج- مجموعة الأعداد الكبيرة.
- د- مجموعة الحدائق الجميلة في المملكة.

في هذا مثال نعتبر أ و ب مجموعتين لأن عناصرها معروفة ومحددة أما بالنسبة للمجموعتين ج و د فلا نعتبرهما رياضياً مجموعتين لأن المعايير الموجودة فيها هي معايير نسبية وليست دقيقة، فمعيار الكبر والجمال يتفاوت من شخص إلى آخر. فإذا عناصر ج و د غير معروفة ومحددة وبالتالي لا نعتبرها مجموعتين. عندما ترد كلمة مجموعة في دراستنا اللاحقة نعني ضمناً مجموعة رياضية.

2.1 رموز المجموعات وعناصرها

عادة ما نرمز للمجموعات (تسميتها) بحروف لاتينية كبيرة مثل: A, B, X, Y ... الخ بينما نرمز للأشياء التي تتألف منها المجموعة والتي تسمى بعناصر المجموعة بحروف صغيرة مثل: a, b, x, y ... الخ. وعادة ما تكتب هذه العناصر بين قوسين من النوع $\{ \}$ وتوضع فواصل بينها. فهذا التعريف نكتب المجموعة A التي عناصرها $2, 0, 1, \pi$ - كالتالي: $A = \{-2, 0, 1, \pi\}$

ولما كان 0 عنصراً من المجموعة A فإننا نرمز لذلك رياضياً بالعلاقة $0 \in A$ ونقرأها 0 ينتمي إلى A . أما العنصر 5 مثلاً فلا ينتمي إلى A ونعبر عن هذا بـ $5 \notin A$ وتقرأ 5 لا ينتمي إلى A .

3.1 طرق تعريف المجموعات

هناك ثلاث طرق لتعريف المجموعة وهي كما يلي:

- طريقة التعريف بعلاقة:

في هذه الطريقة نكتفي بذكر عبارة معينة يمكن عندها تحديد عناصر المجموعة فمثلاً نقول A هي مجموعة الأعداد الطبيعية.

هذه الطريقة غير مناسبة للمجموعات التي تكون فيها العلاقة بين العناصر غير واضحة.

• طريقة السرد أو حصر العناصر:

وفيها نقوم بذكر جميع عناصر المجموعة. فمثلاً A مجموعة الأعداد الزوجية المحصورة بين 1 و 9 هي:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

طبعا هذه الطريقة غير مناسبة إلا للمجموعات قليلة العناصر فمثلا لا يمكن سرد كل عناصر مجموعة الأعداد الزوجية. ونلاحظ أن ترتيب العناصر غير مهم في المجموعة فإن المجموعة أعلاه هي أيضا المجموعة: $A = \{4, 6, 2, 8\}$ كما نلاحظ كذلك أن تكرار العنصر لا يغير المجموعة فمثلا

$$A = \{2, 4, 4, 6, 8, 2\}$$

• طريقة القاعدة المعينة:

وفيها يكون تسلسل العناصر له نمطاً ظاهراً بحيث يمكن التعبير عنه بقاعدة معينة. فمثلا المجموعة $A = \{2, 4, 6, 8\}$ يمكن كتابتها بالقاعدة التالية:

$$A = \{x : x \in N, x \text{ زوجي}, 2 \leq x \leq 8\} \text{ حيث } N \text{ مجموعة الأعداد الطبيعية.}$$

وتقرأ A هي المجموعة المكونة من العناصر x حيث x عدد زوجي طبيعي أكبر من أو يساوي 2 وأصغر من أو يساوي 8.

4.1 المجموعة الجزئية

نقول إن B هي مجموعة جزئية من المجموعة A إذا كانت محتواة في A أو بمعنى آخر إن جميع عناصر B موجودة في المجموعة A ونرمز لهذا كالتالي: $B \subset A$ ويمكن كتابتها رياضيا كالتالي:

$$B \subset A \Leftrightarrow \forall x \in B \Rightarrow x \in A \quad (\forall : \text{يقراً مهما يكون})$$

إذا كانت $B \subseteq A$ و $A \neq B$ فنقول إن B مجموعة جزئية فعلية من A ونكتب $B \subset A$. أما إذا كانت B ليست مجموعة جزئية من A فنكتب $B \not\subset A$.

مثال 1: لتكن المجموعات التالية: $A = \{3, 5, 11, 24\}$ $B = \{5, 24\}$ $C = \{3, 11, 12\}$

نلاحظ في هذا المثال عند مقارنة B و C مع A أن: $B \subset A$ لا $C \subset A$ لأن العدد 12 لا ينتمي إلى

A

5.1. تساوي مجموعتين

نقول أن المجموعتين A و B متساويتان ونكتب $A = B$ إذا كانت كل منها مجموعة جزئية من الآخر أي أن

$$A = B \Leftrightarrow A \subseteq B \text{ و } B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x \in A \Rightarrow x \in B \text{ و } \forall x \in B \Rightarrow x \in A$$

مثال 2: هل المجموعتين التاليتين متساويتين:

$$A = \{2,4,6,8\}, B = \{x : x \in N, x \text{ عدد زوجي}, x < 10\}$$

الحل:

عناصر المجموعة A معروفة ومحددة ولكن عناصر المجموعة B غير محددة فيجب علينا إذا تحديد عناصرها، الأعداد الطبيعية الزوجية أقل من 10 هي: 2,4,6,8

$$\text{إذا: } B = \{2,4,6,8\} \text{ ومنه نستنتج أن } A = B$$

6.1. المجموعة الشاملة والمجموعة الخالية

عند دراسة أي ظاهرة علمية أو اجتماعية فإننا نتعامل مع مجموعة أساسية كبيرة تحتوي على جميع المجموعات تحت الدراسة. فمثلا يمكن أن نصنف على جميع طلبة الكلية كمجموعة أساسية بينما مجموعات الطلبة في التخصصات المختلفة هي مجموعات جزئية من المجموعة الأساسية. نسمي مثل هذه المجموعة الأساسية بالمجموعة الشاملة ونرمز لها بالرمز U . فمثلا تعتبر المجموعة $U = \{-5,2,7,21\}$ هي مجموعة شاملة بالنسبة للمجموعات $A = \{2,21\}$ و $B = \{-5,7,21\}$ لأن المجموعات A و B مجموعات جزئية من U .

المجموعة الخالية هي المجموعة التي لا تحتوي على أي عنصر ويرمز لها بالرمز ϕ أو $\{\}$. فمثلا المجموعة $A = \{x : x < 0 \text{ و } x > 0\}$ هي مجموعة خالية لأنه ليس هناك عنصر يحقق الشرط المذكور. مفهوم المجموعة الخالية يقابله مفهوم الصفر في الأعداد. تعتبر المجموعة الخالية مجموعة وحيدة وجزئية من أي مجموعة أخرى.

خصائص المجموعة الجزئية

$$1) \phi \subseteq A \subseteq U, \quad 2) A \subseteq A, \quad 3) A \subseteq B \text{ و } B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C, \quad 4) A = B \Rightarrow A \subseteq B \text{ و } B \subseteq A$$

تمارين

تمرين 1: أي من الجمل التالية تحدد مجموعة رياضية

- أ- مجموعة القاعات الكبيرة داخل الكلية.
 ب- مجموعة المسلمين المجاهدين في غزوة بدر.
 ج- مجموعة الأعداد الطبيعية التي تقبل القسمة على 5
 د- مجموعة الأعداد الطبيعية التي هي أكبر من 1 وأصغر من 2.
 هـ- مجموعة الطلبة الأذكياء في الكلية.

تمرين 2: اذكر عناصر المجموعات التالية

- 1) $A = \{x : x \in N, 3 < x < 12\}$, 2) $B = \{x : x \in N, x \text{ فردي}, 3 \leq x < 11\}$,
 3) $C = \{x : x \in N, 4x - 3 = 1\}$, 4) $D = \{x : x \in N, x + 1 = 0\}$,
 5) $E = \{x : x = 5n - 6, n \in N, 1 \leq n < 5\}$, 6) $F = \{x : x \in N, \sqrt{x^2 + 1} = 2\}$.

تمرين 3: عبر عن المجموعات التالية بقاعدة معينة:

- 1) $A = \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2\}$, 2) $B = \{0, 4, 8, 12, 16, \dots\}$,
 3) $C = \{\dots - 10, -5, 0, 5, 10, \dots\}$, 4) $D = \{1, 4, 9, 16, 25, 36, 49\}$

تمرين 4: لتكن المجموعات التالية:

$$\phi, A = \{1\}, B = \{1, 3\}, C = \{1, 3, 5\}, D = \{1, 2, 3, 4, 5\}, E = \{1, 3, 5, 7, 9\}, U = \{1, 2, \dots, 8, 9\}$$

أملأ الفراغات التالية بالرمز المناسب:

- 1) $\phi \dots A$, 2) $A \dots B$, 3) $B \dots C$, 4) $B \dots E$,
 5) $C \dots D$, 6) $C \dots E$, 7) $D \dots E$, 8) $D \dots U$

تمرين 5: هل العبارات التالية صحيحة أم خاطئة:

- 1) $a = \{a\}$, 2) $5 \in \{5\}$, 3) $9 \in \{1, 3, 6, \dots\}$, 4) $\phi \subseteq A$,
 5) $A \not\subseteq U$, 6) $\phi \in \{\phi\}$, 7) $4 \in \{1, 2, 3, \{4\}\}$, 8) $7 \notin \{3, 4, 2, \{5\}\}$.


2. العمليات على المجموعات

1.2 اتحاد مجموعتين

إذا كانت A و B مجموعتين فإن اتحادهما هي مجموعة جميع العناصر الموجودة في كل من A أو B ونرمز لهذه العملية بالرمز $A \cup B$ ونعرفها رياضياً كما يلي:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ أو } x \in B\}$$

ويمكن تمثيل ذلك بأشكال توضيحية تسمى أشكال فن حيث تمثل المجموعة الشاملة U بالمستطيل والمجموعتين A و B بدوائر داخل المستطيل ويكون اتحادهما المنطقة المظللة كما هو موضح بالرسم التالي:



مثال 3: لتكن المجموعتان $A = \{1, 2, 3, 5\}$ و $B = \{2, 4, 6\}$ إذا: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

خصائص الاتحاد

- 1) $A \cup A = A,$
- 2) $A \cup \phi = A,$
- 3) $A \cup U = U,$
- 4) $A \subseteq (A \cup B), B \subseteq (A \cup B),$
- 5) $A \cup B = B \cup A,$
- 6) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$


الخاصية 5 هي الخاصية التبادلية والخاصية 6 هي الخاصية التجميعية.

2.2 تقاطع مجموعتين

إذا كانت A و B مجموعتين فإن تقاطعهما هي مجموعة العناصر المشتركة بين A و B ونرمز للتقاطع بالرمز $A \cap B$ ونعرفه كما يلي:

$$A \cap B = \{x : x \in A \text{ و } x \in B\}$$

ويمثل تقاطع مجموعتين بأشكال فن بالمنطقة المظللة كما هو موضح بالرسم التالي:



مثال 4: لتكن المجموعتين: $A = \{x : x \in N, x \geq 6\}$, $B = \{x : x \in N, x \geq 11\}$ إذا:

$$A \cap B = \{x : x \in N, x \geq 11\}$$

خصائص التقاطع

- 1) $A \cap A = A$,
 - 2) $A \cap \phi = \phi$,
 - 3) $A \cap U = A$,
 - 4) $(A \cap B) \subseteq A$, $(A \cap B) \subseteq B$,
 - 5) $A \cap B = B \cap A$,
 - 6) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$.
- الخاصية 5 هي الخاصية التبادلية والخاصية 6 هي الخاصية التجميعية.

3.2. العلاقة بين الإتحاد والتقاطع (قانون التوزيع)

لتكن A , B , C ثلاثة مجموعات ما فيمكن أن نقول:

$$1) A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

وكذلك يمكن أن نقول:


$$2) A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

4.2. الفرق بين مجموعتين

نعرف حاصل طرح المجموعة B من المجموعة A بأنه مجموعة العناصر التي هي موجودة في A وفي نفس الوقت ليست موجودة في B ويرمز لهذا الفرق بالرمز $A - B$ ونكتب رياضياً:

$$A - B = \{x : x \in A \text{ و } x \notin B\}$$

ويمثل الفرق بين مجموعتين بأشكال فن بالمنطقة المظلمة كما هو موضح بالرسم



مثال 5: لتكن المجموعتين: $A = \{1, 5, 6, 12, 20\}$, $B = \{3, 6, 12, 18, 20\}$ إذا: $A - B = \{1, 5\}$

خصائص الفرق


- 1) $A - A = \phi$,
- 2) $A - \phi = A$,
- 3) $A - U = \phi$,
- 4) $A - B = B - A \Leftrightarrow A = B$,
- 5) $A - B = A \Leftrightarrow A \cap B = \phi$,
- 6) $A - B = \phi \Leftrightarrow A \subseteq B$.

5.2. متممة المجموعة

إذا كانت U مجموعة شاملة بالنسبة للمجموعة A ، نعرف متممة A بأنها مجموعة العناصر الموجودة في U وفي نفس الوقت ليست موجودة في A (أي بمعنى آخر $U - A$). ونرمز لمتممة A بالرمز \bar{A} وتكون:

$$\bar{A} = U - A = \{x : x \in U \text{ و } x \notin A\}$$

وتمثل بأشكال فن بالمنطقة المظلمة كما هو موضح بالرسم



مثال 6: لتكن المجموعتين: $U = N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$, $A = \{1, 2, 3\}$ إذا: $\bar{A} = \{4, 5, 6, \dots\}$

خصائص المتممة

- 1) $\bar{\bar{A}} = A$,
- 2) $\bar{A} \cap A = \phi$,
- 3) $\bar{\phi} = U$,
- 4) $\bar{U} = \phi$,
- 5) $\bar{\bar{A}} = A$.

6.2. قانون دي مورغان

لتكن A و B مجموعتين ضمن المجموعة الشاملة U عندئذ يتحقق التالي:

$$1) \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad 2) \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}.$$

تمارين

المجموعات المشار إليها في تمارين 1 إلى 3 هي المجموعة الشاملة $U = \{1, 2, \dots, 9\}$ والمجموعات التالية:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad B = \{4, 5, 6, 7\}, \quad C = \{5, 6, 7, 8, 9\}, \\ D = \{1, 3, 5, 7, 9\}, \quad E = \{2, 4, 6, 8\}, \quad F = \{1, 5, 9\}.$$

تمرين 1: أوجد ما يلي:

$$a) A \cup B \text{ و } A \cap B \quad b) B \cup D \text{ و } B \cap D \quad c) A \cup C \text{ و } A \cap C \\ d) D \cup E \text{ و } D \cap E \quad e) E \cup F \text{ و } E \cap F \quad f) D \cup F \text{ و } D \cap F$$

تمرين 2: أوجد ما يلي:

$$1) \bar{A}, \bar{B}, \bar{C}, \bar{D} \quad 2) A - B \quad 3) B - A \quad 4) D - E \quad 5) F - D$$

تمرين 3: أوجد ما يلي:

$$1) A \cap (B \cup E), \quad 2) \overline{A - E}, \quad 3) \overline{A \cap D} - B, \quad 4) (B \cap F) \cup (C \cap E).$$

تمرين 4: اختصر ما يلي:

$$1) A \cap B \cap \bar{A}, \quad 2) (\bar{A} \cup \phi) \cup A, \quad 3) (A \cup B) \cap \bar{B}, \quad 4) (A \cap B) \cup (\bar{A} \cap B), \\ 5) \overline{A \cup B} \cup \bar{A} \cap B, \quad 6) A \cup B \cup \bar{A}, \quad 7) (A \cap U) \cup \bar{A}, \quad 8) [(A \cap B) \cup (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)] \cap B.$$


تمرين 5: لتكن A و B مجموعتين باستخدام أشكال فن ظلل $A \cap \bar{B}$ و $\overline{B - A}$ في كل من الحالات

التالية:

$$1) A \cap B \neq \phi, \quad 2) A \cap B = \phi, \quad 3) B \subset A.$$

تمرين 6: الرسم التالي يبين ثلاثة مجموعات A, B, C . ظلل المجموعات التالية:

$$1) A - (B \cup C), \quad 2) \bar{A} \cap (B \cup C), \quad c) \bar{A} \cap (C - B).$$



تمرين 7: بين قانون توزيع التقاطع على الاتحاد وقانون ديمورغان باستخدام أشكال فن.

تمرين 8: بين أن: $(A \cup B) \cap (A \cup \bar{B}) = A$

الفصل الثاني: المجموعات العددية

1. مجموعات الأعداد

في دراستنا العلمية نحتاج للتعامل مع عدة مجموعات عددية كل منها توسيع وامتداد لسابقتها وقد سبق للطالب دراستها في مراحل التعليم العام وفيما يلي تذكير وتأسيس هذه المجموعات.

1.1. مجموعة الأعداد الطبيعية

مجموعة الأعداد الطبيعية هي مجموعة الأعداد الأساسية المألوف عليها ونرمز لها بالحرف اللاتيني الكبير N :

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

2.1. مجموعة الأعداد الكلية

وما هي إلا مجموعة الأعداد الطبيعية N مضافا إليها العدد 0 ويرمز لها بالحرف W . وبمعنى آخر $W = N \cup \{0\}$ وتصبح:

$$W = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

3.1. مجموعة الأعداد الصحيحة

بإضافة مجموعة الأعداد السالبة إلى المجموعة W نحصل على مجموعة جديدة تسمى مجموعة الأعداد الصحيحة ونرمز لها بالحرف Z ، إذا:

$$Z = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$$

4.1. مجموعة الأعداد النسبية

وهي المجموعة التي تكون فيها الأعداد على شكل كسر عددين صحيحين (بسط ومقام) بشرط أن لا يساوي المقام فيها الصفر ونرمز لها بالحرف Q . ويمكن تعريفها كما يلي:

$$Q = \left\{ \frac{m}{n} : m \in Z, n \in Z, n \neq 0 \right\}$$

نلاحظ هنا أن أي عدد صحيح هو عدد نسبي لأنه يمكن كتابته على شكل كسر بحيث يكون المقام

$$\text{في هذا الكسر العدد } 1, \text{ فمثلا } -2 = \frac{-2}{1} \text{ وبشكل أعم } m = \frac{m}{1}.$$

نلاحظ أن مجموعة الأعداد الطبيعية N مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الكلية W و W مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد الصحيحة Z و Z مجموعة جزئية من مجموعة الأعداد النسبية Q ، أي باستخدام رمز الاحتواء يكون لدينا: $N \subset W \subset Z \subset Q$

2. العمليات الحسابية على مجموعات الأعداد

1.2. العمليات الحسابية على N

نعرف هنا فقط عمليتي الجمع والضرب لأن حاصل عملية الطرح والقسمة لعددتين طبيعيتين ليس بالضروري أن يكون عددا طبيعيا. عمليتي الجمع والضرب في المجموعة N تحققان الخواص التالية:

$$\begin{aligned} 1) a + b = b + a, & \quad 2) a \cdot b = b \cdot a, & \quad 3) (a + b) + c = a + (b + c), \\ 4) (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c), & \quad 5) a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c), & \quad 6) a \cdot 1 = a \quad \forall a. \end{aligned}$$

(1 و 2) يمثلان الخاصية التبادلية للجمع والضرب، (3 و 4) يمثلان خاصية التجميعية، (5) تمثل خاصية توزيع الضرب على الجمع و (6) تبين أن العدد 1 محايد بالنسبة للضرب. مع العلم أن عملية الجمع ليست توزيعية على عملية الضرب فمثلا: $4 + (3 \times 5) \neq (4 + 3) \times (4 + 5)$.

2.2. العمليات الحسابية على W

نفس العمليتين والخواص المعرفة على N أعلاه مع الملاحظة في هذه المجموعة هناك عنصراً محايداً بالنسبة لعملية الجمع وهو الصفر: $a + 0 = a$

3.2. العمليات الحسابية على Z

بالإضافة إلى عملية الجمع والضرب فإن عملية الطرح أيضا معرفة على المجموعة Z وذلك لأن حاصل طرح عددين صحيحين يكون دائما عدد صحيح. وعملية الطرح ما هي في الأصل إلا عملية جمع لأن:

$$b \in Z \Rightarrow -b \in Z, \quad a - b = a + (-b) \in Z$$

مع الملاحظة أن عملية الطرح ليست تبديلية ولا تجميعية وليس لها عنصرا محايدا.

4.2. العمليات الحسابية على Q

في هذه المجموعة جميع العمليات الأربعة: الجمع، الطرح، الضرب والقسمة معرفة. وتعرف هذه العمليات حسب القواعد التالية:

$$1) \frac{m}{n} + \frac{p}{q} = \frac{qm + np}{nq} \quad 2) \frac{m}{n} - \frac{p}{q} = \frac{qm - np}{nq} \quad 3) \frac{m}{n} \cdot \frac{p}{q} = \frac{mp}{nq} \quad 4) \frac{m}{n} \div \frac{p}{q} = \frac{m}{n} \cdot \frac{q}{p} = \frac{mq}{np}$$

في حالة تساوي المقامات تختصر عملية الجمع والطرح والقسمة كالتالي:

$$1) \frac{m}{n} + \frac{p}{n} = \frac{m+p}{n} \quad 2) \frac{m}{n} - \frac{p}{n} = \frac{m-p}{n} \quad 3) \frac{m}{n} \div \frac{p}{n} = \frac{m}{p}$$

عمليتي الجمع والضرب تحقق جميع الخواص التي مرت علينا في المجموعة N أما الطرح والقسمة في هذه المجموعة غير تبديليه ولا تجميعية وليس لأي منهما عنصر محايد.

$$\text{مثال 1: احسب ما يلي:} \quad 1) \frac{1}{4} + \frac{2}{9}, \quad 2) \frac{2}{5} - \frac{4}{5}, \quad 3) \frac{3}{7} \times \frac{2}{5}, \quad 4) \frac{3}{5} \div \frac{4}{7}.$$

الحل:

$$1) \frac{1}{4} + \frac{2}{9} = \frac{1 \times 9 + 2 \times 4}{4 \times 9} = \frac{9+8}{36} = \frac{17}{36}, \quad 2) \frac{2}{5} - \frac{4}{5} = \frac{2-4}{5} = \frac{-2}{5},$$

$$3) \frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{3 \times 2}{7 \times 5} = \frac{6}{35}, \quad 4) \frac{3}{5} \div \frac{4}{7} = \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{4} = \frac{3 \times 7}{5 \times 4} = \frac{21}{20}.$$

1.4.2. خواص الأعداد النسبية

(1) يتساوى عدنان نسبيان إذا كان حاصل ضرب البسط الأول في المقام الثاني يساوي حاصل ضرب المقام الأول في البسط الثاني أي أن:

$$\frac{m}{n} = \frac{p}{q} \Leftrightarrow mq = np$$

$$\text{فمثلا } \frac{5}{6} = \frac{10}{12} \text{ لأن } 5 \times 12 = 6 \times 10 = 60$$

(2) ضرب أو قسمة الكسر بنفس العدد (غير الصفر) لا يؤثر في قيمة الكسر أي أن:

$$\frac{p}{q} = \frac{pn}{qn} = \frac{p}{q}$$

$$\frac{6}{15} = \frac{6 \times 2}{15 \times 2} = \frac{12}{30} \text{ فمثلاً}$$

(3) يمكن اختصار الكسر $\frac{p}{q}$ إلى أبسط صورة $\frac{p'}{q'}$ (أي كسراً غير قابل للاختصار) حيث لا يوجد قواسم مشتركة بين q' و p' سوى الواحد. فمثلاً أبسط صورة للكسر $\frac{9}{12}$ هي $\frac{3}{4}$.

2.4.2. الكسور المركبة

الكسر المركب هو الكسر المكون من عدد صحيح وكسر على شكل $\frac{a}{c}$. فمثلاً $4\frac{2}{5}$ هو كسر مركب. يمكن تحويل الكسر المركب إلى كسر بجمع العدد الصحيح فيه مع الكسر كما هو مبين في المثال التالي

مثال 2: حول الكسر المركب $6\frac{2}{3}$ إلى كسر:

الحل:

$$6\frac{2}{3} = 6 + \frac{2}{3} = \frac{6}{1} + \frac{2}{3} = \frac{6 \times 3 + 2 \times 1}{3} = \frac{18 + 2}{3} = \frac{20}{3}$$

3.4.2. مقارنة كسرين

ليكن $\frac{m}{n}, \frac{p}{q} \in Q$ حيث المقامات أعداد موجبة، نعرف علاقة الترتيب أصغر من ($<$) بين هذين

الكسرين بالقاعدة التالية: $\frac{p}{q} < \frac{m}{n} \Leftrightarrow pn < qm$ حيث n, q أعداد موجبة

أي أن $\frac{p}{q}$ أصغر من $\frac{m}{n}$ إذا وفقط إذا كان حاصل ضرب البسط الأول في المقام الثاني أصغر من حاصل

ضرب المقام الأول في البسط الثاني، فمثلاً: $\frac{2}{5} < \frac{3}{7}$ لأن $2 \times 7 < 5 \times 3$ ، كما أن $\frac{-3}{4} < \frac{-5}{9}$ لأن

$$-3 \times 9 < 4 \times (-5)$$

4.4.2 الأعداد العشرية

نسمي الكسر الذي قواسم مقامه فقط العدد 2 و 5 بالكسر العشري فمثلا $\frac{3}{4}$ ، $\frac{7}{5}$ كسور عشرية. ولتحويل مثلا الكسر $\frac{123}{10000}$ إلى عدد عشري نكتب البسط وهو 123 ثم نتحرك من يمين العدد 3 إلى اليسار ثلاث خانوات ويتبقى خانة في أصفار المقام نضفه على يسار العدد ومن ثم نضيف الفاصلة لنحصل على أن $0.0123 = \frac{123}{10000}$ مع ملاحظة أن العدد العشري لا يتأثر بإضافة أصفار إلى يمينه فمثلا $0.7 = 0.70 = 0.700$ ولكن الأمر يختلف تماما عند إضافة أصفار إلى اليسار فمثلا $0.5 = \frac{5}{10}$ يختلف كليا عن $0.05 = \frac{5}{100}$ ومن هذا الشرح نستنتج خاصية الأعداد العشرية المنتهية وغير المنتهية.

الأعداد العشرية المنتهية وغير المنتهية

يمكن تمثيل الكسر العشري كعدد عشري ذي عدد منته من الخانات أما الكسور الأخرى لا يمكن تمثيلها على هذه الصورة. فمثلا $\frac{3125}{10000} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$ بينما $0.333..... = \frac{1}{3}$ أي أن $\frac{1}{3}$ لا يمكن تمثيله على هيئة عدد عشري منته لأن مقامه ليس من قوى 2 أو 5. ولتوضيح ذلك نكتب الكسر على الشكل التالي: $0.\bar{3} = \frac{1}{3}$ وهذا يعني أن الخانة 3 تتكرر عدداً لا نهائياً من المرات على يمين الفاصلة. مثال آخر على ذلك: $0.09\bar{09}..... = \frac{1}{11} = 0.090909.....$. عادة ما نسمي مثل هذه الأعداد أعداد عشرية دورية.

- أي كسر عشري يمثل بعدد عشري منته (أي عدد الخانات منته)
- أي كسر غير عشري يمثل بعدد عشري غير منته (أي عدد الخانات لا نهائي) ولكنه دوري أي يحوي عدد من الخانات التي تتعاقب بشكل غير منتهى.

تحويل العدد العشري إلى عدد كسري

إن أي عدد عشري منته يمكن تحويله إلى عدد كسري وذلك بجعل البسط نفس العدد العشري بعد حذف الفاصلة أما المقام فهو 10 مرفوعة لأس يساوي عدد الخانات بعد الفاصلة فمثلا:

$$5.23014 = \frac{523014}{10^5}$$

5.4.2. العمليات الحسابية على الأعداد العشرية

جمع وطرح عددين عشريين

أولاً نوحّد عدد الخانات العشرية على يمين الفاصلة وذلك بإضافة أصفار على يمين العدد الأقل خاناً لأن ذلك لا يؤثر في قيمة العدد العشري ثم نجمع الخانات المتناظرة كما في جمع الأعداد الصحيحة مع الاحتفاظ بموضع الفاصلة فمثلاً:

$$1) 11.2541 + 3.97 = 11.2541 + 3.9700 = 15.2241$$

$$2) 16.23 - 8.567 = 16.230 - 8.567 = 7.663$$

ضرب عددين عشريين

نجري عملية الضرب كما نجرها لعددين صحيحين بدون أي اعتبار للفاصلة وبعد ذلك نضع الفاصلة بحيث يكون عدد الخانات العشرية في الناتج يساوي مجموع الخانات العشرية للعددين المضروبين فمثلاً للقيام بالعملية 4.6×3.52 نجري أولاً العملية $46 \times 352 = 16212$ وحيث إن مجموع الخانات العشرية في المضروبين هو $2 + 1 = 3$ نحدد الفاصلة في الناتج بعد ثلاثة خاناً ابتداءً من يمين العدد أي يكون الناتج

$$4.6 \times 3.52 = 16.212$$

قسمة عددين عشريين

في البداية نساوي عدد الخانات العشرية كما رأينا في عملية الجمع والطرح ثم نقوم بعملية القسمة كما هو مألوف بين عددين صحيحين حتى يصبح القاسم أقل من المقسوم عليه، عند هذه المرحلة نضيف إلى يمين القاسم صفراً مع وضع فاصلة في الناتج ونواصل القسمة مع إضافة صفراً إلى القاسم كلما قل عن المقسوم عليه كما في المثال التالي:

مثال 4: أجز عملية القسمة التالية: $15.48 \div 7.2$

الحل:

	2.15
720	1548
-	1440
	1080
-	720
	3600
-	3600
	0000

وبذلك فإن الناتج (أو خارج القسمة) هو 2.15

كما يمكن التأكد من صحة القسمة

بضرب الناتج في المقسوم عليه لينتج القاسم.

6.4.2. تقريب الأعداد العشرية

نحتاج في الحسابات العلمية لتقريب وتقليل الخانات العشرية وخصوصا في الأعداد العشرية غير المنتهية. والقاعدة المتبعة في التقريب لعدد محدود من الخانات العشرية هي كالتالي:

- عند حذف الخانات بدأ من خانة معينة ننظر لأول خانة محذوفة من اليسار فإذا كان عددها 5 أو ما أكثر في هذه الحالة نضيف للخانة ما قبل المحذوفة العدد 1.
- إذا كانت أول خانة محذوفة أقل من 5 فنحذف الخانات الزائدة بدون أي إضافات على الخانات المتبقية.

مثال 5: قرب الأعداد العشرية التالية إلى ثلاثة خانة فقط: 1) 5.145512 2) 3.21945

الحل:

(1) حيث أن أول خانة محذوفة هي 5 يضاف عند التقريب واحد إلى الخانة الأولى غير المحذوفة أي تصبح

6 بدلا من 5 ويصبح العدد بعد التقريب $5.146 \approx 5.145512$

(2) أول خانة محذوفة هي 4 وبالتالي العدد بعد التقريب هو $3.219 = 3.21945$

تمارين

تمرين 1: أجز العمليات الحسابية التالية بدون استخدام الآلة الحاسبة:

$$1) \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \frac{1}{5} \quad 2) \frac{3}{5} - \frac{2}{3} + \frac{3}{4} \quad 3) 3\frac{5}{8} + 5\frac{1}{32} \quad 4) 4\frac{1}{3} + 3\frac{1}{5} - 5\frac{3}{4} \quad 5) 8 - 2\frac{2}{3} - 1\frac{3}{4}$$

$$6) 6 \times \frac{2}{3} \quad 7) 2\frac{1}{2} \times \frac{3}{15} \times 1\frac{1}{4} \quad 8) \frac{4}{5} \div 2\frac{7}{15} \quad 9) 2\frac{1}{2} \times \frac{7}{8} \div 3\frac{3}{4} \quad 10) \left(\frac{2}{7} \div \frac{3}{4}\right) - \left(\frac{-2}{3} \div \frac{4}{9}\right)$$

تمرين 2: احسب ما يلي بدون استخدام الآلة الحاسبة:

$$1) \frac{\left(9 + \frac{1}{2}\right)(5 - 7)}{2 \times \frac{5}{8}} \quad 2) \frac{(5 - 8) \times \frac{2}{3}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{5}} \quad 3) -2 \times (-8 - 3) \times \left(\frac{1}{4} \div 5\right) \quad 4) \frac{1\frac{1}{2} - 3\frac{1}{4}}{5\frac{3}{7} - 2\frac{4}{5}}$$

تمرين 3: رتب الكسور في الفقرة (1) تصاعدياً من الأصغر إلى الأكبر وفي الفقرة (2) تنازلياً من الأكبر إلى الأصغر:

$$1) \frac{1}{4}, \frac{-1}{2}, \frac{3}{-4}, \frac{2}{5}, \frac{5}{11} \quad 2) \frac{5}{9}, \frac{-2}{3}, \frac{7}{13}, \frac{8}{15}, \frac{4}{-7}$$

تمرين 4: حول كلاً مما يلي إلى أعداد عشرية:

$$1) \frac{3}{8}, \quad 2) \frac{7}{16}, \quad 3) \frac{15}{25}, \quad 4) \frac{22}{125}$$

تمرين 5: حول كلاً مما يلي إلى أعداد عشرية دورية غير منتهية:

$$1) \frac{5}{11}, \quad 2) \frac{4}{21}, \quad 3) \frac{8}{35}$$

تمرين 6: حول كلاً مما يلي إلى أعداد كسرية:

$$1) 0.0975, \quad 2) 1.\overline{13}, \quad 3) 4.25\overline{31}$$

تمرين 7: أجز العمليات الحسابية التالية بدون استخدام الآلة الحاسبة:

$$1) 97 + 364.23 + 0.759, \quad 2) 7.58 + 94.6 + 4.989, \quad 3) 0.917 - 1.165, \quad 4) 362.78 - 457.06, \\ 5) 4.5 \times 9.72, \quad 6) 57.8 \times 0.023, \quad 7) 18.598 \div 5.47, \quad 8) 6.75 \div 106$$

تمرين 8: قرب الأعداد التالية في خانتي وفي ثلاثة خانتي:

$$1) 3.401902 \quad 2) 11.989601 \quad 3) 1.012903 \quad 4) 19.569492$$

3. الأعداد الحقيقية

مجموعة الأعداد الحقيقية والتي نرسم لها بالرمز R تحتوي على مجموعة الأعداد الطبيعية والأعداد الكلية والأعداد الصحيحة والأعداد النسبية (التي تكلمنا عليها في بداية هذا الباب) بالإضافة إلى الأعداد غير النسبية وهي الأعداد التي لا يمكن كتابتها على الطريقة التي عرفنا بها المجموعة Q سابقا مثل $\sqrt{2}$ و π .


1.3. خط الأعداد الحقيقية

تحدد الأعداد النسبية على خط الأعداد بتقسيم الفترة. فمثلا $\frac{8}{3} = 2\frac{2}{3}$ هو على بعد ثلثي $\left(\frac{2}{3}\right)$ من العدد

2 إلى العدد 3. الأعداد غير النسبية موضوعة بين عددين نسبيين مناسبين تقريبيين، فمثلا

$\sqrt{2} \approx 1.41421$ يظهر بين 1.4142 و 1.4143 كذلك بعض الأعداد النسبية وغير النسبية مبينة على

الخط كما هو موضح على الرسم التالي:



2.3. العمليات الحسابية على R

جميع العمليات الحسابية المعرفة على Q هي أيضا معرفة على R ولها نفس الخواص كما في المجموعة Q إلا أن R أيضا معرف عليها عملية ليست معرفة على Q وهي عملية الجذر. \sqrt{a} حيث a عدد حقيقي موجب فلا بد أن $\sqrt{a} \in R$ بينما وجدنا أعلاه أن $2 \in Q$ ولكن $\sqrt{2} \notin Q$. وفي الواقع هناك كثير من العمليات معرفة على R وليست معرفة على Q ولكن ليس المجال مناسب لذكرها هنا.

4. الفترات

بعض المجموعات للأعداد الحقيقية مهمة جدا في التطبيقات.


1.4. الفترات المنتهية

في هذه الحالة يكون طول الفترة منتهياً وينقسم إلى أربع حالات كالتالي:

(1) الفترة المفتوحة من a إلى b والتي يرمز إليها بي (a, b) هي مجموعة الأعداد الحقيقية بين a و b دون قيمتي a و b وتكون:

$$(a, b) = \{x : a < x < b\}$$

مع الملاحظة أن $a \notin (a, b)$ و $b \notin (a, b)$ ونسمي a و b نقاط النهاية للفترة كما هو موضح في الرسم




○ تدل على أن القيمة ليست ضمن الفترة

(2) الفترة المغلقة من a إلى b والتي يرمز إليها بي $[a, b]$ هي مجموعة الأعداد الحقيقية بين a و b إضافة إلى قيمتي a و b وتكون:

$$[a, b] = \{x : a \leq x \leq b\}$$

مع الملاحظة أن $a \in [a, b]$ و $b \in [a, b]$ ونسمي a و b نقاط النهاية للفترة كما هو موضح في الرسم



● تدل على أن القيمة ضمن الفترة

(3) الفترة نصف المفتوحة من اليمين والتي يرمز لها $[a, b)$ هي مجموعة الأعداد الحقيقية بين a و b وفي هذه الحالة تكون قيمة a ضمن الفترة أما قيمة b خارج الفترة وتكون:

$$[a, b) = \{x : a \leq x < b\}$$


مع الملاحظة أن $a \in [a, b)$ و $b \notin [a, b)$ ونسمي a و b نقاط النهاية للفترة كما هو موضح في الرسم التالي:



(4) الفترة نصف المفتوحة من اليسار والتي نرمز لها $(a, b]$ هي مجموعة الأعداد الحقيقية بين a و b وفي هذه الحالة تكون قيمة a خارج الفترة أما قيمة b ضمن الفترة وتكون:

$$(a, b] = \{x : a < x \leq b\}$$

مع الملاحظة أن $a \notin (a, b]$ و $b \in (a, b]$ ونسمي a و b نقاط النهاية للفترة كما هو موضح في الرسم التالي:



2.4. الفترات غير المنتهية

يمكن أن تكون الفترة غير منتهية في طولها وهنا كذلك تنقسم إلى أربع حالات

(1) رمز مجموعة الأعداد الواقعة على يسار عدد معين a هو $(-\infty, a)$ وتعني المجموعة:

$$(-\infty, a) = \{x : x < a\}$$

(2) رمز مجموعة الأعداد الواقعة على يمين عدد معين a هو (a, ∞) وتعني المجموعة:

$$(a, \infty) = \{x : x > a\}$$

(3) رمز مجموعة الأعداد الواقعة على يسار عدد معين a ومغلقة من جهته هو $(-\infty, a]$ وتعني المجموعة:

$$(-\infty, a] = \{x : x \leq a\}$$

(4) رمز لمجموعة الأعداد الواقعة على يمين عدد معين a ومغلقة من جهته بالرمز $[a, \infty)$ وتعني المجموعة:

$$[a, \infty) = \{x : x \geq a\}$$

(5) رموز مجموعة الأعداد الحقيقية هي $R = (-\infty, \infty)$

مع الملاحظ أن الرموز $-\infty$ و ∞ فقط تدل على ناقص وموجب ما لا نهاية ولا تعتبر أعدادا حقيقية يمكن تطبيق عليها قواعد الجبر المعتادة.

مثال 6: مثل الفترات التالية على خط الأعداد:

$$1) [-4, 1],$$

$$2) [-2, 3),$$

$$3) (1, 5),$$

$$4) (1, 4],$$









$$5) [4, \infty),$$

$$6) (-\infty, 3],$$

$$7) (-\infty, 2] \cup (3, \infty),$$

$$8) (-\infty, 1) \cup [2, \infty).$$

الحل:



5. القيمة المطلقة

القيمة المطلقة لعدد حقيقي a والتي يرمز لها ب $|a|$ هي المسافة بين a والنقطة 0 على خط الأعداد. فمثلا $|2|=2$ و $|-2|=2$ وفي العموم إذا كانت $a \geq 0$ فإن $|a|=a$ ولكن إذا كانت $a < 0$ فإن $|a|=-a$ لأن $-a$ موجب. وبهذا نصل إلى التعريف التالي للقيمة المطلقة:

$$|a| = \begin{cases} a & ; \text{ إذا كانت } a \geq 0 \\ -a & ; \text{ إذا كانت } a < 0 \end{cases}$$

ومن هذا التعريف لأي عدد حقيقي a أو b يمكن استنتاج النظريات التالية:

$$1) |a| \geq 0 \quad 2) |ab| = |a| |b| \quad 3) \left| \frac{a}{b} \right| = \frac{|a|}{|b|} \quad 4) |a+b| \leq |a| + |b| \quad 5) |a-b| = |b-a|$$

مثال 7: أعد كتابة ما يلي بدون القيمة المطلقة

$$1) |4|, \quad 2) |-8|, \quad 3) |3| - |-7|, \quad 4) -|-3| - |8|,$$

$$5) |4| - |-8|, \quad 6) |x^2 + 1|$$

الحل:

$$(1) \text{ لأن } 4 > 0 \text{ إذا } |4| = 4$$

$$(2) \text{ لأن } -8 < 0 \text{ إذا } |-8| = -(-8) = 8$$

$$(3) |3| - |-7| = 3 - [-(-7)] = 3 - (7) = 3 - 7 = -4$$

$$(4) -|-3| - |8| = -[-(-3)] - (8) = -(3) - (8) = -3 - 8 = -11$$

$$(5) |4| - |-8| = (4) [-(-8)] = (4)(8) = 32$$

$$(6) \text{ لأن } x^2 \geq 0 \text{ إذا } x^2 + 1 > 0 \text{ وبالتالي } |x^2 + 1| = x^2 + 1$$

تمارين

تمرين 1: مثل الفترات التالية على خط الأعداد

$$1) (1, 5), \quad 2) (1, 4], \quad 3) [-2, 1), \quad 4) [1, 4], \quad 5) (-\infty, 0], \quad 6) (\pi, \infty),$$

$$7) (-\infty, 3) \cup (3, \infty), \quad 8) (-\infty, 1) \cup [4, \infty), \quad 9) [-2, 1) \cup [2, 4] \cup (5, \infty).$$

تمرين 2: أعد كتابة ما يلي بدون القيمة المطلقة

$$1) |6|, \quad 2) |-6|, \quad 3) |2 \times (-3)|, \quad 4) |2| \cdot |-3|,$$

$$5) \left| \frac{-2}{3} \right|, \quad 6) \frac{|-2|}{|3|}, \quad 7) |1 - \sqrt{2}|, \quad 8) |7 - 9|.$$

تمرين 3: أوجد قيمة $|x + 3|$ إذا كانت:

$$1) x = 7, \quad 2) x = -8, \quad 3) x = 0, \quad x = \frac{-2}{3}.$$

تمرين 4: أعد كتابة ما يلي بدون القيمة المطلقة

$$1) |y^2 + 1|, \quad 2) |x + 6| + |x - 2|, \quad 0 < x < 1, \quad 3) |x - 4| + |x + 5|, \quad 2 < x < 3$$

رياضيات تخصصية

كثيرات الحدود

اسم الوحدة: كثيرات الحدود

الجدارة:

الإلمام بفهم كثيرات الحدود والعمليات الحسابية عليها

الأهداف:

بعد دراسة هذه الوحدة يكون للطالب القدرة على معرفة:

- كثيرات الحدود والعمليات الحسابية عليها.
- تحليل كثيرات الحدود بطرق مختلفة (العامل المشترك، طريقة المميز).
- حل المعادلات من الدرجة الأولى والثانية ذات مجهول واحد.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة 80% .

الوقت المتوقع للتدريب: ستة ساعات للفصل الأول و أربعة ساعات للفصل الثاني، بحيث يكون الوقت الكلي عشر ساعات.

الفصل الأول: كثيرات الحدود

1. تعريف كثيرات الحدود

تعريف 1: يكون الحد الجبري إما ثابتاً أو متغيراً أو حاصل ضرب ثابتاً في متغير واحد أو أكثر بشرط أن يكون أس المتغير عدداً صحيحاً غير سالب. يسمى الثابت معامل الحد الجبري وتكون درجة الحد الجبري هي حاصل جمع أسس المتغيرات فيه.

مثال 1: معامل الحد الجبري $3x^2y - 3$ هو -3 ودرجته تساوي 3.

تعريف 2: كثيرات الحدود هي عبارة عن جمع عدد منته من الحدود ودرجتها هي أكبر درجة حد فيها. الحدود التي تحتوي على نفس المتغير (بما فيه الأس) تسمى الحدود المتشابهة، فمثلاً $12x^2$ و $-9x^2$ حدان متشابهان ولكن الحدود $2x^3y$ و $7x^3y^2$ ليست متشابهة. تتم عملية الاختصار بجمع الحدود المتشابهة فمثلاً يختصر $4x^2 + 3x - 2x$ إلى $4x^2 + x$. درجة الحد الثابت دائماً تساوي الصفر ($2 = 2x^0$).

الشكل العام لكثيرات الحدود للمتغير x هو كالتالي:

هو المعامل الرئيسي و a_0 هو الحد الثابت. حيث $a_n \neq 0$ و n عدد صحيح غير سالب. المعامل a_n

مثال 2: الجدول التالي يبين المعامل الرئيسي، الدرجة، الحدود والمعاملات لثلاثة كثيرات حدود:

المعامل الرئيسي	المعاملات	الدرجة	الحدود	كثيرة الحدود
9	9, -1, 5	2	$9x^2, -x, 5$	$9x^2 - x + 5$
-2	-2, 11	1	$-2x, 11$	$11 - 2x$
1	1, 5, -3	3	$x^3, 5x, -3$	$x^3 + 5x - 3$

2. العمليات الحسابية على كثيرات الحدود

1.2. جمع وطرح كثيرات الحدود

مثال 3: اختصر ما يلي:

$$1) (3x^2 + 6x - 4) + (4x^2 - 5x + 3), \quad 2) (x^2 - 5x + 7) - (2x^2 + 3x - 2).$$

الحل:

$$1) (3x^2 + 6x - 4) + (4x^2 - 5x + 3) = (3x^2 + 4x^2) + (6x - 5x) + ((-4) + 3) = 7x^2 + x - 1$$

$$2) (x^2 - 5x + 7) - (2x^2 + 3x - 2) = (x^2 - 2x^2) + [(-5x) - (+3x)] + (7 - (-2)) = -x^2 - 8x + 9$$

2.2 ضرب كثيرات الحدود.

لضرب كثيرات الحدود نذكر ببعض تعاريف الأسس وخصائصها والتي سوف نتطرق إليها بأكثر تفصيلا في الوحدة الثالثة

تعريف 3: ليكن لدينا عدد حقيقي x وعدد طبيعي n فيكون x أس n هو:

$$x^n = x \times x \times \dots \times x \quad n \text{ مرة}$$

$$x^0 = 1 \quad \text{بينما:}$$

تعريف 4: ليكن لدينا عدد حقيقي $x \neq 0$ وعدد طبيعي n فيكون x أس $-n$ هو:

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

نظرية 1: إذا كان كل من x و y عددا حقيقيا لا يساوي الصفر وكان كل من n و m عددا صحيحا فإن:

$$1) (x^n)^m = x^{nm}$$

$$2) (x y)^n = x^n y^n$$

$$3) x^n x^m = x^{n+m}$$

$$4) \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$$

تعريف 5: تتم عملية الضرب بتوزيع جميع الحدود في القوس الأول على جميع الحدود في القوس الثاني وهكذا.

مثال 4: احسب واختصر ما يلي: $(2x - 3)(3x^2 - x + 1)$

الحل:

$$(2x - 3)(3x^2 - x + 1) = (2x)(3x^2) + (2x)(-x) + (2x)(1) + (-3)(3x^2) + (-3)(-x) + (-3)(1)$$

$$= 6x^3 - 2x^2 + 2x - 9x^2 + 3x - 3 = 6x^3 - 11x^2 + 5x - 3$$

بعض القوانين المشهورة لحاصل الضرب:

1) $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$

2) $(x + y)(x + y) = (x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$

3) $(x - y)(x - y) = (x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$

4) $(x + y)(x + y)(x + y) = (x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$

5) $(x - y)(x - y)(x - y) = (x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$

مثال 5: أوجد حاصل الضرب التالي باستخدام القوانين المشهورة:

1) $(7x + 10)(7x - 10)$, 2) $(2y^2 + 11z^2)^2$, 3) $(2x - 3y)^3$.

الحل:

1) $(7x + 10)(7x - 10) = (7x)^2 - (10)^2 = 49x^2 - 100$

2) $(2y^2 + 11z^2)^2 = (2y^2)^2 + 2(2y^2)(11z^2) + (11z^2)^2 = 4y^4 + 44y^2z^2 + 121z^4$

3) $(2x - 3y)^3 = (2x)^3 - 3(2x)^2(3y) + 3(2x)(3y)^2 - (3y)^3 = 8x^3 - 36x^2y + 54xy^2 - 27y^3$

3.2. حساب قيمة كثيرة الحدود عند قيمة معينة للمتغير

مثال 6: احسب قيمة $2x^3 - 6x^2 + 7$ عندما: 1) $x = -4$, 2) $x = \sqrt{2}$.

الحل:

يتم حساب هذه القيمة بتعويض x بالقيم المعطاة كالتالي:

1) $2x^3 - 6x^2 + 7 = 2(-4)^3 - 6(-4)^2 + 7 = 2(-64) - 6(16) + 7 = -128 - 96 + 7 = -217$

2) $2x^3 - 6x^2 + 7 = 2(\sqrt{2})^3 - 6(\sqrt{2})^2 + 7 = 2(2\sqrt{2}) - 6(2) + 7 = 4\sqrt{2} - 12 + 7 = 4\sqrt{2} - 5$

4.2. قسمة كثيرات الحدود (القسمة الطويلة)

تعريف 6: قسمة كثيرة حدود على كثيرة حدود تشبه عملية القسمة المستعملة في تقسيم الأعداد الصحيحة.

مثال 7: لتقسيم $x^2 + 9x - 16$ على $x - 3$ نتبع الطريقة التالية:

	$x + 12$
$x - 3$	$x^2 + 9x - 16$
-	$x^2 - 3x$
	$12x - 16$
-	$12x - 36$
	20

إذا في هذا المثال يكون حاصل قسمة $x^2 + 9x - 16$ على $x - 3$

هو $x + 12$ وبقاى القسمة هو 20

وبالتالى يكون لدينا: $x^2 + 9x - 16 \div (x - 3) = x + 12 + \frac{20}{x - 3}$

تمارين

تمرين 1: اذكر الحدود والمعاملات والدرجة والمعامل الرئيسي لكل من كثيرات الحدود التالية:

$$1) x^2 + 2x - 7, \quad 2) \sqrt{2}, \quad 3) 4x^2y^2 - 5x^3y^2 + 17xy^3,$$

$$4) 2x^4 + 3x^3 + 4x^2 + 5, \quad 5) x^3 - 1, \quad 6) -9x^5y + 10xy^4 - 11x^2y^2.$$

تمرين 2: احسب واختصر ما يلي:

$$1) (3x^2 + 4x + 5) + (2x^2 + 7x - 2), \quad 5) (5x - 7)(3x^2 - 8x - 5),$$

$$2) (4w^2 - 2w + 7) + (5w^3 + 8w^2 - 1), \quad 6) (3x^2 - 2x + 5)(2x^2 - 5x + 2),$$

$$3) (7s^2 - 4s + 11) - (-2s^2 + 11s - 9), \quad 7) (3c - 2)(4c + 1)(5c - 2),$$

$$4) (u^3 - 3u^2 - 4u + 8) - (u^2 - 2u + 4), \quad 8) (4u - 5)(2u - 1)(3u - 4).$$

تمرين 3: استخدم القوانين المشهورة لحساب واختصار ما يلي:

$$1) (3x + 5)(3x - 5), \quad 7) [(x + 5) + y][(x + 5) - y],$$

$$2) (4x^2 - 3y)(4x^2 + 3y), \quad 8) [(x - 2y) + 7][(x - 2y) - 7],$$

$$3) (3x^2 - y)^2, \quad 9) (x - 1)^3,$$

$$4) (4w + z)^2, \quad 10) (2x + y)^3,$$

$$5) [(x - 2) + y]^2, \quad 11) [(x - 1) + 2y]^3,$$

$$6) [(x + 3) - y]^2, \quad 12) [4 - (1 - 2y)]^3.$$

تمرين 4: أوجد قيم كثيرات الحدود التالية عند النقاط المعطاة:

$$1) x^2 + 7x - 1; x = 3$$

$$2) -x^2 - 5x + 4; x = -5$$

$$3) 5x^3 - x^2 + 5x - 3; x = -1$$

$$4) 1 - x^3 - x^5; x = 2$$

تمرين 5: استعمل طريقة القسمة المطولة لقسمة كثيرة الحدود الأولى على الثانية:

$$1) 20x^3 + 2x^2 + 3x + 20, x + 3$$

$$2) 6x^4 + 3x^3 - 12x^2 - 3x - 9, 2x - 3$$

$$3) 2x^4 - x^3 - 23x^2 + 9x + 45, 2x^2 - x - 5$$

$$4) 24x^5 + 21x^3 - 18x^2 - 15, 6x^2 + 5$$

3. تحليل كثيرات الحدود

تعريف 7: عملية كتابة كثيرة حدود على شكل حاصل ضرب كثيرات حدود من درجة أقل تسمى تحليلًا وعملية التحليل تساعدنا في اختصار العبارات الكسرية وفي حل المعادلات وسنتطرق في هذا الباب إلى كثيرات حدود ذات المعاملات الصحيحة فقط.

3.1. طريقة العامل المشترك الأكبر (أ.ع.م)

في هذه الطريقة نحاول إيجاد أكبر عامل مشترك بين الحدود إذا كان هذا ممكنًا كما هو موضح في المثال التالي.

مثال 8: حلل كثيرات الحدود التالية باستخدام العامل المشترك الأكبر:

$$1) 10x^3 + 6x, \quad 2) 12x^2y - 6xy - 30xy^2, \quad 3) (x-4)(2a-b) + (x+4)(2a-b).$$

الحل:

(1) نلاحظ في الفقرة الأولى أن (أ.ع.م) بين $10x^3$ و $6x$ هو $2x$ فبالتالي يكون التحليل كما يلي:

$$10x^3 + 6x = 2x(5x^2) + 2x(3) = 2x(5x^2 + 3)$$

(2) في هذه الفقرة نلاحظ أن (أ.ع.م) بين الحدود الثلاثة هو $6xy$ فبالتالي يكون التحليل كما يلي:

$$12x^2y - 6xy - 30xy^2 = 6xy(2x) - 6xy(1) - 6xy(5y) = 6xy(2x - 1 - 5y) = 6xy(2x - 5y - 1)$$

(3) هنا نلاحظ أن (أ.ع.م) هو كثير الحدود $2a - b$ فبالتالي يكون التحليل كما يلي:

$$\begin{aligned} (x-4)(2a-b) + (x+4)(2a-b) &= (2a-b)[(x-4) + (x+4)] = (2a-b)(x-4+x+4) \\ &= (2a-b)(2x) = 2x(2a-b) \end{aligned}$$

هناك حالات يتم فيها التحليل بتجميع حدود معينة كما هو موضح في المثال التالي.

مثال 9: حلل كثيرة الحدود التالي: $6y^3 - 21y^2 - 4y + 14$

الحل:

نقوم أولاً بتجميع الحدين الأولين وتجميع الحدين الأخيرين كالتالي:

$$6y^3 - 21y^2 - 4y + 14 = (6y^3 - 21y^2) - (4y - 14)$$

ثم نأخذ (أ.ع.م) لكل من المجموعتين كالتالي:

$$6y^3 - 21y^2 - 4y + 14 = (6y^3 - 21y^2) - (4y - 14) = 3y^2(2y - 7) - 2(2y - 7)$$

وفي الأخير نلاحظ أن $2y - 7$ أصبح عامل مشترك بين المجموعتين فإذا أصبح التحليل كما يلي:

$$6y^3 - 21y^2 - 4y + 14 = (6y^3 - 21y^2) - (4y - 14) = 3y^2(2y - 7) - 2(2y - 7) \\ = (2y - 7)(3y^2 - 2)$$

2.3. طريقة تحليل كثيرة الحدود $ax^2 + bx + c$

الحالة الأولى: $a = 1$

في هذه الحالة يجب أن نوجد كثيري حدود يكون حاصل ضرب حديهما الأول يساوي x^2 وحاصل ضرب حديهما الثاني يساوي c وجمعهما الجبري يساوي b . المثال التالي يوضح هذه الطريقة.

مثال 10: حل كثيرة الحدود التالي: $x^2 + 7x - 18$

الحل:

في هذه الحالة $b = 7$ و $c = -18$ إذا يجب البحث عن عددين حاصل ضربيهما يساوي -18 وجمعهما الجبري يساوي 7 . فالعددين حسب الشرطين المذكورين هما -2 و 9 لأن: $(-2) + 9 = 7$ و $(-2) \times 9 = -18$.. وهكذا يصبح التحليل كما يلي:

$$x^2 + 7x - 18 = (x - 2)(x + 9)$$

ويمكن التأكد من هذا الحل بفك الأقواس.

في حالة عدم استطاعة إيجاد العددين حسب الشرطين المذكورين نحاول التحليل بطرق أخرى سنذكرها في هذا الفصل.

الحالة الثانية: $a \neq 1$

في هذه الحالة نبحث عن أربعة أعداد صحيحة m, n, p, q تستوفي الشروط الثلاثة التالية:

$$1) mn = a, 2) pq = c, 3) mq + np = b$$

وعند إيجاد هذه الأعداد يكون التحليل كما يلي:

$$ax^2 + bx + c = (mx + p)(nx + q)$$

مع الملاحظة أن إشارة p و q تكون نفس إشارة b إذا كان $c > 0$ ومختلفتان إذا كان $c < 0$. يتم اختيار m و n على أساس الشرط (1) ويتم اختيار p و q على أساس الشرط (2) ثم نستخدم الشرط (3) للتأكد من صحة الأعداد m, n, p, q .

مثال 11: حل كثيرة الحدود التالي: $6x^2 + 11x + 3$

الحل:

يجب إيجاد الأعداد الصحيحة m, n, p, q حيث: $mn = 6, pq = 4, mq + np = 11$

مع العلم أن إشارة p و q موجبة لأن $c > 0$ و $b > 0$ وبطريقة التجربة والخطأ نجد في الأخير أن: $m = 2, n = 3, p = 3, q = 1$ إذا يكون التحليل كما يلي:

$$6x^2 + 11x + 3 = (2x + 3)(3x + 1)$$

ملاحظة: حتى يكون $ax^2 + bx + c$ قابلاً للتحليل بمعاملات صحيحة يجب أن تكون القيمة $b^2 - 4ac$ مربعاً كاملاً. فمثلاً $6x^2 - 5x - 4$ قابل للتحليل لأن $b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(6)(-4) = 121 = 11^2$. إذا كان $m = n$ و $p = q$ فنقول إن $ax^2 + bx + c$ هو مربع كامل وتحليله يساوي $(mx + p)^2$

3.3. طريقة تحليل فرق مربعين

في هذه الطريقة نستخدم إحدى القوانين المشهورة التي ذكرناها في بداية هذا الباب وهي:

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

مثال 12: حلل $49x^2 - 144$

الحل:

يمكن كتابة $49x^2 - 144$ على شكل $49x^2 - 144 = (7x)^2 - (12)^2$ وهذا يسمح لنا بتطبيق القانون المذكور أعلاه ويصبح التحليل كالتالي:

$$49x^2 - 144 = (7x)^2 - (12)^2 = (7x + 12)(7x - 12)$$

تمارين

تمرين 1: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1	تحليل كثيرة الحدود $x^2 - 9x + 20$ هو a) $(x+10)(x+2)$ b) $(x+5)(x+4)$ c) $(x-5)(x-4)$ d) $(x+10)(x+10)$
2	تحليل كثيرة الحدود $x^2 + 7x + 6$ هو a) $(x+3)(x+2)$ b) $(x-5)(x-2)$ c) $(x+6)(x+1)$ d) $(x-1)(x-6)$
3	تحليل كثيرة الحدود $x^2 + 2x - 24$ هو a) $(x+4)(x+6)$ b) $(x-4)(x+6)$ c) $(x-8)(x+3)$ d) $(x+6)(x-5)$
4	تحليل كثيرة الحدود $6x^4 + 14x^3 - 12x^2$ هو a) $2x^2(3x^2 + 7x - 6)$ b) $2(3x^2 + 7x - 6)$ c) $(x+3)(x^2 + 2)$ d) $(7x+3)(2x+4)$
5	تحليل كثيرة الحدود $x^2 - 36$ هو a) $(x+36)(x-36)$ b) $(x+6)(x-6)$ c) $(x+4)(x^2 - 9)$ d) $(x^2 + 6)(x^2 - 6)$

تمرين 2: حل كل مما يلي باستخدام الطريقة المناسبة:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1) $-15x^2 - 12x,$ | 8) $6m^3 + 4m^2 - 15m - 10,$ | 15) $6x^4 + 23x^2 + 15,$ |
| 2) $6a^3b^2 - 12a^2b + 72ab^3,$ | 9) $x^2 + 9x + 20,$ | 16) $x^2 - 9,$ |
| 3) $(x-4)(m+2n) + n(x-4),$ | 10) $b^2 + 12b - 28,$ | 17) $81b^2 - 16c^2,$ |
| 4) $x(y-3) - 5(3-y),$ | 11) $8a^2 - 26a + 15,$ | 18) $x^4 - 9,$ |
| 5) $3x^3 + x^2 + 6x + 2,$ | 12) $6x^2 - 23x + 20,$ | 19) $16y^4 - 196,$ |
| 6) $2x^2 - 2xy + x - y,$ | 13) $x^4 + 11x^2 + 18,$ | 20) $1 - 121n^2,$ |
| 7) $10z^3 - 15z^2 - 4z + 6,$ | 14) $9x^4 + 10x^2 + 1,$ | 21) $x^2 - (y+z)^2,$ |

4. الكسور الجبرية (العبارات النسبية)

تعريف 8: كما أن الأعداد النسبية هي عبارة عن قسمة عددين صحيحين فالكسور الجبرية تعتبر قسمة كثيري حدود.

مثال 13: تعتبر $\frac{3x+1}{2x-5}$ و $\frac{x^2-3x+4}{x^2+7x+12}$ كسور جبرية.

مجال الكسر الجبري هو كل الأعداد الحقيقية باستثناء الأعداد التي تجعل المقام يساوي الصفر لأن القسمة في هذه الحالة تكون غير معرفة.

مثال 14: مجال $\frac{2x}{x^2-3x}$ هو كل الأعداد الحقيقية دون $x=3$ و $x=0$ لأن قيمة المقام عند هذه النقاط تساوي الصفر.

نظرية 2: خصائص الكسور الجبرية هي كالتالي:

$$1) \frac{P}{Q} = \frac{R}{S} \Leftrightarrow PS = QR, \quad 2) \frac{P}{Q} = \frac{PR}{QR}, \quad R \neq 0, \quad 3) -\frac{P}{Q} = \frac{-P}{Q} = \frac{P}{-Q} \quad 4) \frac{P}{Q} \pm \frac{R}{Q} = \frac{P \pm R}{Q},$$

$$5) \frac{P_1}{Q_1} \pm \frac{P_2}{Q_2} = \frac{P_1 \times Q_2 \pm P_2 \times Q_1}{Q_1 \times Q_2}, \quad 6) \frac{P}{Q} \times \frac{R}{S} = \frac{PR}{QS}, \quad 7) \frac{P}{Q} \div \frac{R}{S} = \frac{P}{Q} \times \frac{S}{R} = \frac{PS}{QR}, \quad R \neq 0.$$

اختصار الكسور الجبرية

عملية اختصار الكسر الجبري هو حذف المعاملات المشتركة في البسط والمقام. فإذا عملية الاختصار تتطلب منا الإدراك الجيد بعمليات التحليل التي مرت بنا في هذا الباب.

مثال 15: اختصر ما يلي:

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 5x + 6}$$

الحل:

أولا نقوم بتحليل البسط والمقام بالطرق التي مرت بنا سابقا كالتالي:

$$x^2 + 2x - 3 = (x-1)(x+3), \quad x^2 + 5x + 6 = (x+2)(x+3)$$

إذن يختصر الكسر كالتالي:

$$\frac{x^2 + 2x - 3}{x^2 + 5x + 6} = \frac{(x-1)(x+3)}{(x+2)(x+3)} = \frac{x-1}{x+2}, \quad x+3 \neq 0 \Rightarrow x \neq -3$$

ملاحظة: $\frac{x+6}{2} = \frac{x}{2} + \frac{6}{2} = \frac{x}{2} + 3$ وإنما $\frac{x+6}{2} \neq x+3$

مثال 16: اختصر كل مما يلي:

$$1) \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 2} \cdot \frac{x-1}{x-2}, \quad 2) \frac{x^2 + 6x + 9}{x^3 + 27} \div \frac{x^2 + 7x + 12}{x^3 - 3x^2 + 9x}$$

الحل:

$$1) \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 + x - 2} \times \frac{x-1}{x-2} = \frac{(x-2)(x-3)}{(x-1)(x+2)} \times \frac{x-1}{x-2} = \frac{(x-2)(x-3)(x-1)}{(x-1)(x+2)(x-2)} = \frac{x-3}{x+2}, \quad x \neq 1 \quad x \neq 2$$

$$2) \frac{x^2 + 6x + 9}{x^3 + 27} \div \frac{x^2 + 7x + 12}{x^3 - 3x^2 + 9x} = \frac{(x+3)(x+3)}{(x+3)(x^2 - 3x + 9)} \div \frac{(x+4)(x+3)}{x(x^2 - 3x + 9)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+3)}{(x+3)(x^2 - 3x + 9)} \times \frac{x(x^2 - 3x + 9)}{(x+4)(x+3)}$$

$$= \frac{(x+3)(x+3)x(x^2 - 3x + 9)}{(x+3)(x^2 - 3x + 9)(x+4)(x+3)} = \frac{x}{x+4}, \quad x \neq -3$$

مثال 17: احسب واختصر ما يلي:

$$1) \frac{2mn + m}{m + n} - \frac{mn + m}{m + n}, \quad 2) \frac{x}{x+1} + \frac{3}{2x-1}, \quad 3) \frac{x}{x^2 - 4} - \frac{2x-1}{x^2 - 3x - 10}$$

الحل:

في مثل هذه المسائل بعد تحليل المقام (إذا كان ذلك ممكنا) يجب أن نبحث عن أصغر مقام مشترك.

$$1) \frac{2mn + m}{m + n} - \frac{mn + m}{m + n} = \frac{(2mn + m) - (mn + m)}{m + n} = \frac{2mn + m - mn - m}{m + n} = \frac{mn}{m + n}$$

$$2) \frac{x}{x+1} + \frac{3}{2x-1} = \frac{x(2x-1) + 3(x+1)}{(x+1)(2x-1)} = \frac{2x^2 - x + 3x + 3}{(x+1)(2x-1)} = \frac{2x^2 + 2x + 3}{(x+1)(2x-1)}$$

$$3) \frac{x}{x^2 - 4} - \frac{2x-1}{x^2 - 3x - 10} = \frac{x}{(x-2)(x+2)} - \frac{2x-1}{(x-5)(x+2)} = \frac{x(x-5) - (2x-1)(x-2)}{(x-2)(x+2)(x-5)}$$

$$= \frac{(x^2 - 5x) - (2x^2 - 4x - x + 2)}{(x-2)(x+2)(x-5)} = \frac{x^2 - 5x - 2x^2 + 4x + x - 2}{(x-2)(x+2)(x-5)}$$

$$= \frac{-x^2 - 2}{(x-2)(x+2)(x-5)} = -\frac{x^2 + 2}{(x-2)(x+2)(x-5)}$$

هناك حالات يكون فيها بسط ومقام الكسر الجبري عبارة عن كسور جبرية. لاختصار مثل هذا الكسر يجب أولاً اختصار كل من البسط والمقام ثم نواصل عملية الاختصار بنفس الطريقة المذكورة سابقاً.

ملاحظة: من الخطأ اختصار $\frac{2x^2 + y}{3x^2}$ و $\frac{x^{-1} + y^{-1}}{z^{-1}}$ كما يلي:

$$\frac{x^{-1} + y^{-1}}{z^{-1}} = \frac{z}{x + y} \quad \text{و} \quad \frac{2x^2 + y}{3x^2} = \frac{2 + y}{3}$$

تمارين

تمرين 1: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

1	اختصار الكسر الجبري $\frac{x^2 + 9x - 10}{x^2 - 100}$ هو a) $x + 10$ b) $\frac{x - 1}{x - 10}$ c) $\frac{9x - 10}{100}$ d) $\frac{9x}{10}$
2	تبسيط الكسر $\frac{10x^3y^2}{2x^5y}$ هو a) xy b) $\frac{5y}{x^2}$ c) $5xy$ d) $5x^8y^3$
3	اختصار الكسر الجبري $\frac{x^2 + 2x}{x + 2}$ هو a) $\frac{x}{2}$ b) x c) $\frac{2x + 1}{x}$ d) $\frac{1}{x}$
4	تبسيط الكسر $\frac{15x^2y^2}{5xy^5}$ هو a) xy b) $3xy^3$ c) $\frac{3x}{y^3}$ d) $5x^8y^3$
5	هو $\frac{15x^2y^2}{5xy^5}$ تبسيط الكسر $\frac{15x^2y^2}{5xy^5}$ a) xy b) $3xy^3$ c) $\frac{3x}{y^3}$ d) $5x^8y^3$
6	اختصار الكسر الجبري $\frac{x^2 - 4}{x + 2}$ هو a) $\frac{x}{2}$ b) $x - 2$ c) $\frac{2x + 1}{x}$ d) $\frac{1}{x}$

تمرين 2: اختصر الكسور الجبرية التالية:

$$1) \frac{x^2 - 4}{(x-2)(x+3)},$$

$$2) \frac{x^2 - x - 20}{3x - 15},$$

$$3) \frac{x^3 - 9x}{x^3 + x^2 - 6x},$$

$$4) \frac{a^3 + 8}{a^2 - 4},$$

$$5) \frac{x^2 + 3x - 40}{-x^2 + 3x + 10},$$

$$6) \frac{10x^2 - 3x - 1}{2x^2 + 5x - 3},$$

$$7) \frac{2x^3 - 6x^2 + 5x - 15}{9 - x^2},$$

$$8) \frac{x^3 - x^2 + x}{x^3 + 1}.$$

تمرين 3: احسب واختصر كلا مما يلي:

$$1) \frac{x^2 + x}{2x + 3} \cdot \frac{3x^2 + 19x + 28}{x^2 + 5x + 4},$$

$$2) \frac{x^2 - 16}{x^2 + 7x + 12} \cdot \frac{x^2 - 4x - 21}{x^2 - 4x},$$

$$3) \frac{12m^2 + 28m + 15}{6m^2 + 35m + 25} \cdot \frac{2m^2 - m - 3}{3m^2 + 11m - 20},$$

$$4) \frac{6u^2 - 5u + 1}{3u^2 + 11u - 4} \div \frac{2u^2 + 3u - 2}{u^2 + 3u - 4},$$

$$5) \frac{z^2 - 81}{z^2 - 16} \div \frac{z^2 - z - 20}{z^2 + 5z - 36},$$

$$6) \frac{2a^2 - 5a + 3}{a^2 + a - 2} \div \frac{3a^2 - 8a - 3}{a^2 - a - 6}.$$

تمرين 4: احسب واختصر كلا مما يلي:

$$1) \frac{9x+1}{2x-1} - \frac{3x+4}{2x-1},$$

$$2) \frac{x+1}{2x+3} + \frac{2x-1}{2x-3},$$

$$3) \frac{x}{x^2-9} - \frac{3x-1}{x^2+7x+12},$$

$$4) \frac{1}{x} + \frac{2}{3x-1} \cdot \frac{3x^2+11x-4}{x-5},$$

$$5) \frac{x+1}{x-3} - \frac{2x}{x-3} \div \frac{x+5}{x-3},$$

$$6) \left(1 + \frac{2}{x}\right) \left(3 - \frac{1}{x}\right).$$

تمرين 5: احسب واختصر كلا مما يلي:

$$1) \frac{2}{2x+1} - \frac{3}{3x+1} + \frac{4}{4x+1},$$

$$2) \frac{1}{x^2+7x+12} + \frac{1}{x^2-9} + \frac{1}{x^2-16},$$

$$3) \frac{2}{x^2-3x+2} + \frac{3}{x^2-1} - \frac{5}{x^2+3x-10},$$

$$4) \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{2x}{x+2} - \frac{2x-1}{x^2-4}.$$

الفصل الثاني : المعادلات

درس المصريون والبابليون المعادلات منذ الألفية الثانية قبل بداية التاريخ الميلادي. ولكن الذي أسس لهذا الفن هو محمد الخوارزمي في كتابه "الجبر والمقابلة" في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري (حوالي سنة 825م) والذي يعتبر المؤسس لأحد فروع الرياضيات المسمى بالجبر. وكان الحافظ لكتابة هذا الكتاب هو حل مسائل الفرائض أو المواريث بطريقة رياضية. وتكمن أهمية المعادلات في إمكانية صياغة كثير من المسائل التطبيقية على شكل معادلات.

1. تعريف المعادلات

تعريف 1: المعادلة هي التساوي بين عبارتين (ككثيري حدود). وتكون هذه المعادلة إما صحيحة لقيم معينة للمجهول وخاطئة لقيم أخرى.

مثال 1: المعادلة $2x + 1 = 7$ تكون صحيحة عندما $x = 3$ وخاطئة لأية قيمة أخرى لـ x . إذن نقول إن $x = 3$ هو حل للمعادلة لأنه عند تعويض x بالقيمة 3 تصبح المعادلة $2(3) + 1 = 7$ وهذا صحيح.

إذن عملية حل معادلة هي إيجاد كل قيم المتغير التي تستوفي المعادلة، وعادة ما نسمي هذه القيم حلول أو جذور المعادلة.

مثال 2: $x = 2$ و $x = 3$ هي حلول للمعادلة $x^2 - 5x + 6 = 0$.

المعادلات المتكافئة هي المعادلات التي تكون لها نفس الحلول وتتم عملية حل معادلة في متغير x بإيجاد سلسلة من المعادلات المتكافئة للمعادلة الأصلية حتى نصل إلى معادلة من الشكل: ثابت $x =$.

لإيجاد هذه المعادلات المتكافئة عادة ما نتبع الطرق التالية:

- اختصار العبارات في طرفي المعادلة إما بجمع الحدود المتشابهة أو بخصائص أخرى مثل التبديلية، التجميعية والتوزيعية: $2x + 3 + 5x = -11$ و $7x + 3 = -11$ معادلتان متكافئتان.
- طرح أو إضافة نفس القيمة إلى طرفي المعادلة: $3x - 7 = 2$ و $3x = 9$ معادلتان متكافئتان.
- ضرب أو قسمة طرفي المعادلة بنفس العدد بشرط أن لا يكون هذا العدد يساوي صفراً:

$$x = 12 \text{ و } \frac{5}{6}x = 10 \text{ معادلتان متكافئتان}$$

1.1 حل المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد:

تعريف 2: معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد هي معادلة خطية ذات مجهول واحد وهي معادلة يمكن كتابتها على الشكل:

$$ax + b = 0 \text{ حيث } a \text{ و } b \text{ عدنان حقيقيان و } a \neq 0$$

مثال 3: حل المعادلات التالية: 1) $2x + 5 = 9$, 2) $\frac{3}{4}x - 6 = 0$, 3) $(x + 2)(5x + 1) = 5x(x + 1)$.

الحل:

(1) يتم حل هذه المعادلة بطرح 5 من طرفي المعادلة ثم بقسمة طرفي المعادلة على 2:

$$2x + 5 - 5 = 9 - 5 \Leftrightarrow 2x = 4 \Leftrightarrow x = 4$$

(2) هنا نضيف 6 إلى طرفي المعادلة ثم نضرب في $\frac{4}{3}$ لتتخلص من الكسر $\frac{3}{4}$:

$$\frac{3}{4}x - 6 = 0 \Leftrightarrow \frac{3}{4}x - 6 + 6 = 0 + 6 \Leftrightarrow \frac{3}{4}x = 6 \Leftrightarrow \left(\frac{4}{3}\right)\left(\frac{3}{4}x\right) = \left(\frac{4}{3}\right)(6) \Leftrightarrow x = 8$$

(3) نقوم أولاً بفك الأقواس ثم نطرح على التوالي 2, $5x$, $5x^2$ من طرفي المعادلة وفي الأخير نقسم على 6:

$$(x + 2)(5x + 1) = 5x(x + 1) \Leftrightarrow 5x^2 + 11x + 2 = 5x^2 + 5x \Leftrightarrow 11x + 2 = 5x$$

$$\Leftrightarrow 6x + 2 = 0 \Leftrightarrow 6x = -2 \Leftrightarrow x = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3} \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$$

ملاحظة: يمكن التأكد من الحل بتعويضه في المعادلة الأصلية.

في حالة وجود متغير في المقام يجب أن نستثني في البداية القيم التي تجعل المقام يساوي الصفر قبل أن نتخلص من المقام. وإذا كانت قيمة الحل في الأخير تساوي إحدى القيم التي استثنيناها في بداية الحل فنرفضها كحل للمعادلة وإذا كانت هي الحل الوحيد فنستنتج أن المعادلة ليس لها حل.

مثال 4: حل المعادلات التالية:

$$1) \frac{x}{x-3} = \frac{24-5x}{x-3}, \quad 2) 1 + \frac{x}{x-5} = \frac{5}{x-5}$$

الحل:

(1) أولاً يجب أن ندرك أن $x \neq 3$ لأن هذه القيمة تجعل من المقام صفراً. ثم نضرب طرفي المعادلة في $(x - 3)$ لتتخلص من المقام ثم نتبع الخطوات التي ذكرناها سابقاً.

$$(x-3)\frac{x}{x-3} = (x-3)\frac{24-5x}{x-3} \Leftrightarrow x = 24 - 5x \Leftrightarrow x + 5x = 24 - 5x + 5x$$

$$\Leftrightarrow 6x = 24 \Leftrightarrow \frac{6x}{6} = \frac{24}{6} \Leftrightarrow x = 4$$

وهذا يعتبر حلاً مقبولاً لأنه يختلف عن العدد 3 الذي استثنيناه من الحل.

(2) هنا كذلك يجب أن ندرك أن $x \neq 5$ لأن هذه القيمة تجعل من المقام صفراً. لتخلص من المقام نضرب طرفي المعادلة في $(x-5)$ ثم نتبع الخطوات التي ذكرناها سابقاً.

$$(x-5)\left(1 + \frac{x}{x-5}\right) = (x-5)\left(\frac{5}{x-5}\right) \Leftrightarrow (x-5)1 + (x-5)\left(\frac{x}{x-5}\right) = (x-5)\left(\frac{5}{x-5}\right)$$

$$\Leftrightarrow x - 5 + x = 5 \Leftrightarrow 2x - 5 = 5 \Leftrightarrow 2x - 5 + 5 = 5 + 5 \Leftrightarrow 2x = 10 \Leftrightarrow x = 5$$

لكن هنا نلاحظ أن قيمة الحل هي القيمة التي تجعل المقام يساوي صفراً فإذاً الحل $x = 5$ مرفوض وفي هذه الحالة نقول أن المعادلة الأصلية ليس لها حلاً.

تمارين

حل المعادلات التالية وتأكد من الحل:

1) $2x + 10 = 40,$

2) $-3y + 20 = 2,$

3) $4x - 11 = 7x + 20,$

4) $4(2x - 17) + 5(3x - 8) = 0,$

5) $\frac{3}{4}x + \frac{1}{2} = \frac{2}{3},$

6) $\frac{1}{2}x + 7 - \frac{1}{4}x = \frac{19}{2},$

7) $5(x+3)(x-3) = 5x(x-1),$

8) $\frac{40-3x}{5x} = \frac{6x+7}{8},$

9) $\frac{3}{x+2} = \frac{5}{2x-7},$

10) $\frac{x}{x-3} = \frac{x+4}{x+2},$

11) $\frac{x+3}{x+5} = \frac{x-3}{x-4},$

12) $2 + \frac{9}{m-3} = \frac{3m}{m-3},$

13) $\frac{4x-3}{2x} = \frac{2x-4}{x-2},$

14) $\frac{12+x}{-4} = \frac{5x-7}{3} + 2,$

15) $\frac{3x}{x+4} = 2 - \frac{12}{x+4},$

16) $\frac{5}{x-3} - \frac{3}{x-2} = \frac{4}{x-3},$

17) $5[x - (4x - 5)] = 3 - 2x,$

18) $6[3y - 2(y - 1)] - 2 + 7y = 0,$

2.1 حل المعادلات من الدرجة الثانية :

تعريف 3: معادلة من الدرجة الثانية هي معادلة يمكن كتابتها على الشكل القياسي التالي:

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad a \neq 0$$

هناك عدة طرق يمكن استخدامها لحل معادلة من الدرجة الثانية وسنتطرق إلى بعض منها في هذا الباب.

1.2.1 طريقة التحليل

إذا كان من الممكن تحليل كثيرة الحدود $ax^2 + bx + c$ باستخدام أعداد صحيحة فيمكن حينئذ

تطبيق خاصية صفر حاصل الضرب كالتالي: $AB = 0 \Leftrightarrow A = 0 \text{ أو } B = 0$

مثال 5: حل المعادلات التالية: $1) x^2 + 8x + 15 = 0, \quad 2) 2x^2 + x - 6 = 0.$

الحل:

1) باستخدام طرق التحليل التي سبق أن رأيناها في هذا الفصل نجد أن

$$x^2 + 8x + 15 = (x + 3)(x + 5)$$

وباستخدام خاصية صفر حاصل الضرب يكون الحل كما يلي:

$$x^2 + 8x + 15 = (x + 3)(x + 5) = 0 \Leftrightarrow \{x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3 \text{ أو } x + 5 = 0 \Leftrightarrow x = -5\}$$

إذن حلول المعادلة $x^2 + 8x + 15 = 0$ هي $x = -3$ و $x = -5$. وجدنا حلين لأن المعادلة من الدرجة الثانية

ويمكن التأكد من الحلول بتعويضها في المعادلة الأصلية.

2) يكون التحليل هنا بالبحث عن قيم للأعداد m, n, p, q لأن $a \neq 1$ ويكون الحل كالتالي:

$$2x^2 + x - 6 = (2x - 3)(x + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow 2x = 3 \Leftrightarrow x = \frac{3}{2} \\ x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -2 \end{cases}$$

إذن حلول المعادلة $2x^2 + x - 6 = 0$ هي $x = \frac{3}{2}$ و $x = -2$

2.2.1 طريقة الجذر التربيعي

إذا كانت A و B عبارتين جبريتين حيث: $A^2 = B$ و $B > 0$ إذن $A = \pm\sqrt{B}$.

مثال 6: حل المعادلات التالية: $1) x^2 - 5 = 0, \quad 2) (x + 1)^2 = 49,$

الحل:

1) بعد إضافة 5 إلى طرفي المعادلة يمكن حلها بطريقة الجذر التربيعي كالتالي:

$$x^2 - 5 + 5 = 0 + 5 \Leftrightarrow x^2 = 5 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{5}$$

إذن الحلول هي: $x = \sqrt{5}$ و $x = -\sqrt{5}$

2) هنا يمكن تطبيق الطريقة مباشرة كالتالي:

$$(x+1)^2 = 49 \Leftrightarrow x+1 = \pm\sqrt{49} \Leftrightarrow x+1 = \pm 7 \Leftrightarrow x+1 = 7 \text{ أو } x+1 = -7$$

$$\Leftrightarrow x = 7 - 1 = 6 \text{ أو } x = -7 - 1 = -8$$

إذن الحلول هي: $x = 6$ و $x = -8$.

3.2.1 طريقة القانون العام (طريقة المميز):

تتلخص طريقة القانون العام في حساب $\Delta = b^2 - 4ac$ ونسمي هذه القيمة بالمميز وتكون:

$$\text{حلول المعادلة: } a \neq 0, \quad ax^2 + bx + c = 0, \text{ هي } x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ولأن قيمة المميز $\Delta = b^2 - 4ac$ موجودة تحت الجذر فهناك ثلاث حالات هي كالتالي:

- إذا كانت القيمة $\Delta = b^2 - 4ac$ موجبة فهناك حلان حقيقيان مختلفان: $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
- إذا كانت القيمة $\Delta = b^2 - 4ac$ تساوي الصفر فهناك حلان حقيقيان متشابهان: $x = \frac{-b}{2a}$
- إذا كانت القيمة $\Delta = b^2 - 4ac$ سالبة فليست هناك حلول حقيقية.

مثال 7: حل المعادلات التالية:

$$1) 2x^2 - 5x + 2 = 0, \quad 2) x^2 + 6x + 9 = 0, \quad 3) 3x^2 + 6x + 7 = 0.$$

الحل:

1) في هذه الحالة $a = 2$ $b = -5$ $c = 2$ إذن:

$$b^2 - 4ac = (-5)^2 - 4(2)(2) = 25 - 16 = 9 > 0$$

إذاً فهناك حلان حقيقيان مختلفان وهما:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{9}}{2(2)} = \frac{5 \pm 3}{4} \Leftrightarrow x = \frac{5+3}{4} = \frac{8}{4} = 2 \text{ أو } x = \frac{5-3}{4} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

(2) في هذه الحالة $a=1$ $b=6$ $c=9$ إذن:

$$b^2 - 4ac = (6)^2 - 4(1)(9) = 36 - 36 = 0$$

$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(6)}{2(1)} = -3 \quad \text{إذاً فهناك حلان حقيقيان متشابهان وهما:}$$

(3) في هذه الحالة $a=3$ $b=6$ $c=7$ إذن:

$$b^2 - 4ac = (6)^2 - 4(3)(7) = 36 - 84 = -48 < 0$$

إذن هذه المعادلة ليس لها حل في مجموعة الأعداد الحقيقية.

تمارين

تمرين 1: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي:

حل المعادلة $3x-3=2x+6$ هو a) $x=3$ وحيد b) $x=9$ وحيد c) عدد لانتهائي من الحلول d) مستحيلة الحل	1
حل المعادلة $\frac{6x-5}{2}=3x+1$ هو a) $x=3$ وحيد b) $x=-4$ وحيد c) عدد لانتهائي من الحلول d) مستحيلة الحل	2
حل المعادلة $x^2-5x+6=0$ هو a) $x=2$ $x=3$ b) $x=-2$ c) $x=-2$ $x=0$ d) لا يوجد حلول حقيقية	3
حل المعادلة $2x^2-4x+3=0$ هو a) $x=-2$ $x=2$ b) $x=-4$ $x=3$ c) $x=1$ $x=1$ d) لا يوجد حلول حقيقية	4
حل المعادلة $x^2-4=0$ هو a) $x=4$ $x=-4$ b) $x=2$ $x=-2$ c) $x=-2$ $x=8$ d) لا يوجد حلول حقيقية	5
حل المعادلة $x^2+3x=0$ هو a) $x=5$ $x=1$ b) $x=-5$ $x=3$ c) $x=0$ $x=-3$ d) لا يوجد حلول حقيقية	6

تمرين 2: حل المعادلات التالية بطريقة التحليل

$$1) x^2 - 2x - 15 = 0, \quad 2) 8y^2 + 189y - 72 = 0, \quad 3) 3x^2 - 7x = 0,$$

$$4) 8 + 14t - 15t^2 = 0, \quad 5) (x - 5)^2 - 9 = 0, \quad 6) (2x - 5)^2 - (4x - 11)^2 = 0.$$

تمرين 3: حل المعادلات التالية بطريقة الجذر التربيعي

$$1) x^2 = 81, \quad 2) 2x^2 - 48 = 0, \quad 3) (x - 5)^2 = 36,$$

$$4) (x - 8)^2 = (x + 1)^2, \quad 5) x^2 = (x + 1)^2, \quad 6) 4x^2 = (2x + 3)^2.$$

تمرين 4: حل المعادلات التالية بطريقة المميز

$$1) x^2 - 2x - 15 = 0, \quad 2) x^2 + x - 1 = 0, \quad 3) 2x^2 + 4x + 1 = 0,$$

$$4) 3x^2 - 5x + 3 = 0, \quad 5) x^2 + 3x - 1 = 0, \quad 6) 2x^2 - 5x + 3 = 0,$$

$$7) -x^2 = 7x - 1, \quad 8) 2x^2 + 3x + 5 = 0, \quad 9) 2x^2 + 5x - 3 = 0.$$

رياضيات تخصصية

الدوال الأسية واللوغاريتمية

اسم الوحدة: الدوال الأسية واللوغاريتمية

الجدارة:

معرفة الدوال الأسية واللوغاريتمية والقدرة على حل المعادلات الأسية واللوغاريتمية.

الأهداف: بعد دراسة هذه الوحدة يكون للمتدرب القدرة على معرفة:

- الأسس والعمليات عليها.
- الدوال الأسية.
- الدوال اللوغاريتمية.
- حل المعادلات الأسية.
- حل المعادلات اللوغاريتمية.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة 80% .

الوقت المتوقع للتدريب: ثمان ساعات.

الدوال الأسية واللوغاريتمية

يبدو أن محمد الخوارزمي هو أول من استخدم اللوغاريتمات ووضع لها جداول في بداية القرن الثالث الهجري (بداية القرن التاسع الميلادي)، رغم أن البعض يعتبرون الأسكتلندي *John Napier* هو الأول وذلك في سنة 1614م. وقد يعود أصل كلمة لوغاريتم إلى تغيير وقع في ترجمة اسم الخوارزمي إلى اللاتينية.

وتستخدم الدوال الأسية واللوغاريتمية في كثير من القوانين التجريبية، كما تستخدم اللوغاريتمات خاصة لتمثيل كميات كبيرة جداً.

1. الأسس:

تعريف 1: ليكن لدينا عدد حقيقي x وعدد طبيعي n فيكون x أس n هو:

$$x^n = \underbrace{x \times x \times \dots \times x}_n \text{ مرة } n$$

$$x^0 = 1 \quad \text{بينما:}$$

- الرمز x^n يسمى القوة n للعدد x ويقرأ x أس n أو x مرفوع للقوة n
- في الرمز x^n . العدد x يسمى الأساس و العدد n يسمى الأس.

مثال 1: احسب كلا مما يلي:

$$1) 3^2 \quad 2) (-2)^4 \quad 3) (-3)^3$$

الحل:

$$1) 3^2 = 3 \times 3 = 9$$

$$2) (-2)^4 = -2 \times -2 \times -2 \times -2 = 16$$

$$3) (-3)^3 = -3 \times -3 \times -3 = -27$$

تعريف 2: ليكن لدينا عدد حقيقي $x \neq 0$ وعدد طبيعي n فيكون x أس $-n$ هو:

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}$$

مثال 2: احسب كلا مما يلي:

$$1) 3^{-2}, \quad 2) (-2)^{-4}, \quad 3) (-3)^{-3}$$

الحل:

$$1) 3^{-2} = \frac{1}{3^2} = \frac{1}{9}$$

$$2) (-2)^{-4} = \frac{1}{(-2)^4} = \frac{1}{16}$$

$$3) (-3)^{-3} = \frac{1}{(-3)^3} = \frac{1}{-27} = -\frac{1}{27}$$

1.1 قوانين الأسس

إذا كان كل من x و y عددا حقيقيا لا يساوي الصفر وكان كل من n و m عددا صحيحا فإن:

$$1) (x^n)^m = x^{nm}$$

$$2) (x y)^n = x^n y^n$$

$$3) x^n x^m = x^{n+m}$$

$$4) \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$$

مثال 3: احسب كلا مما يلي:

$$1) (xy)^{-2}, \quad 2) ((-2)^{-4})^2, \quad 3) \frac{(-3)^{-3}}{(-3)^{-4}}, \quad 4) 5^2 5^3$$

الحل:

$$1) (xy)^{-2} = \frac{1}{(xy)^2} = \frac{1}{x^2 y^2}, \quad 2) ((-2)^{-4})^2 = (-2)^{-8} = \frac{1}{(-2)^8} = \frac{1}{32}$$

$$3) \frac{(-3)^{-3}}{(-3)^{-4}} = (-3)^{-3-(-4)} = (-3)^{-3+4} = (-3)^1 = -3,$$

$$4) 5^2 5^3 = 5^{2+3} = 5^5 = 3125$$

2.1 اختصار المقادير الأسية:

يتم اختصار المقادير الأسية على أساس القوانين السابقة

مثال 4: بسط ما يلي إلى أبسط صورة مستخدما قوانين الأسس:

$$1) \frac{8^{-3} \times (18)^2}{81 \times (16)^{-2}}, \quad 2) \frac{x^3 y^5 z^{-4}}{y^3 x^{-2} z^2}, \quad 3) \frac{4^{n+1} \times 6^{1-2n}}{9^{1-n}}$$

الحل:

$$\begin{aligned}
1) \frac{8^{-3} \times (18)^2}{81 \times (16)^{-2}} &= \frac{(2^3)^{-3} \times (2 \times 3^2)^2}{3^4 \times (2^4)^{-2}} = \frac{2^{-9} \times 2^2 \times 3^4}{3^4 \times 2^{-8}} \\
&= \frac{2^{-7} \times 3^4}{3^4 \times 2^{-8}} = 2^{-7+8} \times 3^{4-4} = 2 \times 3^0 = 2 \times 1 = 2 \\
2) \frac{x^3 y^5 z^{-4}}{y^3 x^{-2} z^2} &= x^{3+2} y^{5-3} z^{-4-2} = x^5 y^2 z^{-6} = \frac{x^5 y^2}{z^6} \\
3) \frac{4^{n+1} \times 6^{1-2n}}{9^{1-n}} &= \frac{(2^2)^{n+1} \times (2 \times 3)^{1-2n}}{(3^2)^{1-n}} = \frac{2^{2n+2} \times 2^{1-2n} \times 3^{1-2n}}{3^{2-2n}} \\
&= \frac{2^3 \times 3^{1-2n}}{3^{2-2n}} = 2^3 \times 3^{1-2n-2+2n} = 2^3 \times 3^{-1} = \frac{2^3}{3^1} = \frac{8}{3}
\end{aligned}$$

2. الجذور

تعريف 3: ليكن لدينا عدد حقيقي x و y وعدد طبيعي n يخالف 1 فإن كل عدد حقيقي y يحقق المعادلة: $y = x^n$ يسمى جذرا نونيا للعدد x أو الجذر النوني للعدد x أي أن الجذر هو العملية العكسية للرفع إلى أس عدد طبيعي.

ونرمز للجذر النوني للعدد x بالرمز $\sqrt[n]{x}$ أو $x^{\frac{1}{n}}$

يسمى الجذر من الدرجة 2 بالجذر التربيعي ويرمز له بالرمز $\sqrt{\quad}$ ، بينما يسمى الجذر من الدرجة 3 بالجذر التكعيبي. $\sqrt[3]{\quad}$

تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن حساب جذر من درجة زوجية للأعداد السالبة باستخدام الأعداد الحقيقية.

مثال 5: احسب كلا مما يلي:

$$1) 8^{\frac{1}{3}}, \quad 2) (-27)^{\frac{1}{3}}, \quad 3) 16^{\frac{1}{4}}$$

الحل:

$$\begin{aligned}
1) 8^{\frac{1}{3}} &= \sqrt[3]{8} = 2 \\
2) (-27)^{\frac{1}{3}} &= \sqrt[3]{-27} = -3 \\
3) 16^{\frac{1}{4}} &= \sqrt[4]{16} = 2
\end{aligned}$$

1.2 قوانين الجذور:

إذا كان x, y أعداد حقيقية و m, n أعداد طبيعية فيكون لدينا ما يلي:

$$1) \sqrt[n]{x} \sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$$

$$2) \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$$

$$3) x^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{x})^m$$

$$4) \sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x}$$

$$5) \sqrt[n]{x^n} = \begin{cases} x & \text{فردية } n \\ |x| & \text{زوجية } n \end{cases}$$

مثال 6: احسب كلا مما يلي:

$$1) (-27)^{\frac{2}{3}}, \quad 2) 16^{-\frac{5}{4}}, \quad 3) 25^{\frac{3}{2}}$$

الحل:

$$1) (-27)^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{-27})^2 = (-3)^2 = 9$$

$$2) 16^{-\frac{5}{4}} = \frac{1}{16^{\frac{5}{4}}} = \frac{1}{(\sqrt[4]{16})^5} = \frac{1}{2^5} = \frac{1}{32}$$

$$3) 25^{\frac{3}{2}} = (\sqrt{25})^3 = 5^3 = 125$$

مثال 7: بسط العبارات التالية:

$$1) \sqrt[4]{2xy} \sqrt[4]{4xy^2} \sqrt[4]{2x^2y}, \quad 2) \sqrt[6]{\frac{x^6y^5}{x^2}} \sqrt[6]{\frac{x^3y^5}{xy^4}}, \quad 3) \frac{\sqrt[3]{x^5y^7}}{\sqrt[3]{x^2y}}$$

الحل:

$$1) \sqrt[4]{2xy} \sqrt[4]{4xy^2} \sqrt[4]{2x^2y} = \sqrt[4]{16x^4y^4} \\ = \sqrt[4]{2^4} \sqrt[4]{x^4} \sqrt[4]{y^4} = 2|x||y| = 2|x||y|$$

$$2) \sqrt[6]{\frac{x^6y^5}{x^2}} \sqrt[6]{\frac{x^3y^5}{xy^4}} = \sqrt[6]{\frac{x^9y^5}{x^3y^4}} = \sqrt[6]{x^6} \sqrt[6]{y^6} = |x||y|$$

$$3) \frac{\sqrt[3]{x^5y^7}}{\sqrt[3]{x^2y}} = \sqrt[3]{\frac{x^5y^7}{x^2y}} = \sqrt[3]{x^3} \sqrt[3]{y^6} = x y^2$$

مثال 8: بسّط كلا مما يلي:

$$1) \frac{10x^3 y^2}{5x y^4} \quad 2) \left(\frac{3x}{2y}\right)^2 \left(\frac{5x^3}{y^4}\right) \left(\frac{4y^3}{15x^4}\right) \quad 3) \frac{x^6 y^{-2} z^{-1}}{x^5 y^{-3} z^2} \quad 4) \left(\frac{\sqrt[3]{xy^3}}{\sqrt[4]{-x^2 y}}\right)^6$$

الحل:

$$1) \frac{10x^3 y^2}{5x y^4} = \frac{10}{5} \frac{x^3}{x} \frac{y^2}{y^4} = 2x^{3-1} y^{2-4} = 2x^2 y^{-2} = \frac{2x^2}{y^2}$$

$$2) \left(\frac{3x}{2y}\right)^2 \left(\frac{5x^3}{y^4}\right) \left(\frac{4y^3}{15x^4}\right) = \frac{3^2 x^2}{2^2 y^2} \frac{5x^3}{y^4} \frac{2^2 y^3}{3 \times 5x^4} = \frac{3^2 \times 5 \times 2^2 x^5 y^3}{2^2 \times 3 \times 5x^4 y^6} = 3x y^{-3} = \frac{3x}{y^3}$$

$$3) \frac{x^6 y^{-2} z^{-1}}{x^5 y^{-3} z^2} = x^{6-5} y^{-2-(-3)} z^{-1-2} = x y z^{-3} = \frac{xy}{z^3}$$

$$4) \left(\frac{\sqrt[3]{xy^3}}{\sqrt[4]{-x^2 y}}\right)^6 = \left(\frac{(xy^3)^{\frac{1}{3}}}{(-x^2 y)^{\frac{1}{4}}}\right)^6 = \frac{(xy^3)^{\frac{6}{3}}}{(-x^2 y)^{\frac{6}{4}}} = \frac{(xy^3)^2}{(-x^2 y)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x^2 y^6}{x^2 (-y)^{\frac{3}{2}}} = \frac{x^2 (-y)^6}{x^2 (-y)^{\frac{3}{2}}} = x^{2-3} (-y)^{6-\frac{3}{2}} = x^{-1} (-y)^{\frac{9}{2}} = \frac{(\sqrt{-y})^9}{x}$$

تجدر الإشارة إلى أننا وضعنا $y -$ تحت الجذر لأنه موجب وهذا يستنتج من $\sqrt[4]{-x^2 y}$ فلا بد أن يكون ما تحت جذر من درجة زوجية موجبا لكن x^2 موجب إذن $y -$ موجب أيضا.

3. الدوال الأسية:

تعريف 4: ليكن لدينا عدد حقيقي موجب $b \neq 1$ ومتغير حقيقي x فإن الدالة الأسية ذات الأساس b هي

$$y = f(x) = b^x \quad \text{على الشكل التالي:}$$

مثال 9: حدد أساس كل من الدوال الأسية التالية:

$$1) y = f(x) = 2^{-x}, \quad 2) y = f(x) = \pi^x, \quad 3) y = f(x) = 2^{\frac{x}{2}}$$

الحل:

$$1) \text{ الأساس هو } \frac{1}{2} \text{ لأن: } y = f(x) = 2^{-x} = \frac{1}{2^x} = \left(\frac{1}{2}\right)^x$$

$$2) \text{ الأساس هو } \pi .$$

$$3) \text{ الأساس هو } \sqrt{2} \text{ لأن: } y = f(x) = 2^{\frac{x}{2}} = (\sqrt{2})^x$$

نظرية 1: ليكن لدينا المتغيران الحقيقيان x و y والعدد الحقيقي الموجب $b \neq 1$ فإن:

$$1) b^x > 0, \quad 2) b^x b^y = b^{x+y}, \quad 3) \frac{b^x}{b^y} = b^{x-y}, \quad 4) (b^x)^y = b^{xy}$$

مثال 10: بسّط كلا مما يلي:

$$1) (2^x 2^3)^{\frac{1}{4}}, \quad 2) \frac{5^{-x+2} 25^x}{125^{3+x}}, \quad 3) (\sqrt[3]{9} 3^2)^x$$

الحل:

$$1) (2^x 2^3)^{\frac{1}{4}} = 2^{\frac{x}{4}} 2^{\frac{3}{4}} = 4\sqrt{8} (4\sqrt{2})^x$$

$$2) \frac{5^{-x+2} 25^x}{125^{3+x}} = \frac{5^{-x+2} (5^2)^x}{(5^3)^{3+x}} = \frac{5^{-x+2} 5^{2x}}{5^{9+3x}} = \frac{5^{x+2}}{5^{9+3x}} = 5^{-2x-7} = \frac{1}{5^{2x+7}} = \frac{1}{5^7 5^{2x}}$$

$$= \frac{1}{5^7} \frac{1}{5^{2x}} = \frac{1}{5^7} \left(\frac{1}{5^2}\right)^x = \frac{1}{78125} \left(\frac{1}{25}\right)^x$$

$$3) (\sqrt[3]{9} 3^2)^x = \left((9)^{\frac{1}{3}} 9\right)^x = 9(9^x)$$

1.3 المعادلات الأسية:

قاعدة 1: ليكن لدينا عدنان حقيقيان x و y وعدد حقيقي موجب a حيث $a \neq 1$ فإن:

$$a^x = a^y \Leftrightarrow x = y$$

إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس

قاعدة 2: إذا كان a, b عددين حقيقيين موجبين، x عدد حقيقي فإن:

$$a^x = b^y \Leftrightarrow a = b$$

إذا تساوت الأسس تتساوى الأساسات

مثال 11: حل المعادلات التالية:

$$1) 3^{x-2} = 3^5, \quad 2) x^3 - 1 = 7, \quad 3) \left(\frac{9}{4}\right)^{2x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{6-x}, \quad 4) 5^{x(x-6)} = \left(\frac{1}{25}\right)^4$$

الحل:

$$1) 3^{x-2} = 3^5 \Leftrightarrow x - 2 = 5$$

$$\therefore x = 7$$

$$2) x^3 - 1 = 7 \Leftrightarrow x^3 = 8$$

$$\Leftrightarrow x^3 = 2^3 \quad \therefore x = 2$$

$$3) \left(\frac{9}{4}\right)^{2x} = \left(\frac{2}{3}\right)^{6-x}$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{4x} = \left(\frac{3}{2}\right)^{-6+x}$$

$$\Leftrightarrow 4x = -6 + x \Leftrightarrow 3x = -6 \Leftrightarrow x = -2$$

$$4) 5^{x(x-6)} = \left(\frac{1}{25}\right)^4 \Leftrightarrow 5^{x^2-6x} = (25)^{-4}$$

$$\Leftrightarrow 5^{x^2-6x} = 5^{-8} \Leftrightarrow x^2 - 6x = -8$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 8 = 0 \Leftrightarrow (x-4)(x-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{إما} & x-4=0 \Rightarrow x=4 \\ \text{أو} & x-2=0 \Rightarrow x=2 \end{cases}$$

إذن مجموعة الحل هي : $\{2,4\}$

4. الدوال اللوغاريتمية:

ذكر العالم الرياضي نابير (Napier) في سنة 1614 م في كتابه الذي شرح فيه اللوغاريتمات ما يلي :
"وقد رأيت أن لاشيء أكثر انزعاجاً في العمليات الرياضية ويؤخر المحاسبين من عمليات الضرب
والقسمة وإيجاد الجذور التربيعية والتكعيبية للأعداد الكبيرة، وبالإضافة إلى أنها تضيع وقت طويل
مملاً فهي معرضة لكثير من الأخطاء ولذلك ابتدأت في التفكير بطريقة لإزالة هذه العوائق

لحل المعادلة : $16 = 2^y$ $16 = 2^y$ نحلل العدد في الطرف الأيسر بحيث نكتبه على شكل عدد
أسّي ذا الأساس 2: وبما أن $16 = 2^4$ فيكون لدينا:

$$2^4 = 2^y \Rightarrow y = 4$$

بالمثل

$$100 = 10^y \Rightarrow 10^2 = 10^y \Rightarrow y = 2$$

في حالة صعوبة تحليل العدد في الطرف الأيسر مثل $2 = 10^y$ فبالتالي من الصعوبة إيجاد قيمة y
بالطريقة السابقة لذلك نلجأ لتعيين قيمة y باستخدام دالة جديدة تسمى الدالة اللوغاريتمية .

تعريف 5: ليكن لدينا عدد حقيقي موجب $b \neq 1$ ومتغير حقيقي موجب x فإن الدالة اللوغاريتمية ذات

الأساس b هي على الشكل التالي: $y = \log_b x$ بحيث: $x = b^y$.

أي أن الدالة اللوغاريتمية هي الدالة العكسية للدالة الأسية ($\log_b b^x = x$ و $b^{\log_b x} = x$)

والرمز $\log_a x$ يقرأ لوغاريتم x للأساس a

مثال 12 :

$$(1) \text{ بما أن } 8 = 2^3 \text{ إذن } \log_2 8 = 3$$

$$(2) \text{ بما أن } 32 = 2^5 \text{ إذن } \log_2 32 = 5$$

$$(3) \text{ بما أن } 10000 = 10^4 \text{ إذن } \log_{10} 10000 = 4$$

$$(4) \text{ بما أن } 0.01 = 10^{-2} \text{ إذن } \log_{10} 0.01 = -2$$

1.4 قوانين اللوغاريتمات :

إذا كان كل من a, y, x أعداد حقيقية موجبة، و $a \neq 1$ وكان n عدد حقيقي فإن:

$$1) \log_a 1 = 0$$

$$2) \log_a (x \times y) = \log_a x + \log_a y$$

$$3) \log_a \left(\frac{x}{y} \right) = \log_a x - \log_a y$$

$$4) \log_a x^n = n \log_a x$$

$$5) \log_a a = 1$$

مثال 13 : أوجد قيمة كل لوغاريتم فيما يلي :

$$1) \log_7 7, \quad 2) \log_5 \left(\frac{1}{125} \right), \quad 3) \log_4 16$$

$$4) \log_3 21 - \log_3 7, \quad 5) \log_4 8$$

الحل:

$$1) \log_7 7 = 1$$

$$2) \log_5 \left(\frac{1}{125} \right) = \log_5 1 - \log_5 125 = 0 - \log_5 5^3 = -3 \log_5 5 = -3 \times 1 = -3$$

$$3) \log_4 16 = \log_4 4^2 = 2 \log_4 4 = 2 \times 1 = 2$$

$$4) \log_3 21 - \log_3 7 = \log_3 \frac{21}{7} = \log_3 3 = 1$$

$$5) \log_4 8 = \log_4 2^3 = \log_4 (\sqrt{4})^3 = \log_4 (4^{\frac{1}{2}})^3 = \log_4 4^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \log_4 4 = \frac{3}{2}$$

مثال 14 : اكتب كلا مما يلي باستخدام لوغاريتم واحد :

$$1) \log_3 (x + 3) + 2 \log_3 10 - \log_3 x, \quad 2) -\log_2 6 + \log_2 (3x - 2) + \log_2 (3 - 2x)$$

الحل:

$$1) \log_3(x+3) + 2\log_3 10 - \log_3 x = \log_3(x+3) + \log_3 10^2 - \log_3 x = \log_3 \left(\frac{(x+3) \times 10^2}{x} \right)$$

$$= \log_3 \left(\frac{100(x+3)}{x} \right)$$

$$2) -\log_2 6 + \log_2(3x-2) + \log_2(3-2x) = \log_2 \left(\frac{(3x-2)(3-2x)}{6} \right)$$

حالات خاصة:

تعريف 6: اللوغاريتم العشري هو اللوغاريتم ذو الأساس 10.

يرمز له بالرمز: $\log x$

مثال 15: احسب كلا مما يلي:

$$1) \log 100 + \log 0.001 - \log 1000, \quad 2) -\log 0.1 - \log 0.01 + \log 1000$$

الحل:

$$1) \log 100 + \log 0.001 - \log 1000 = \log 10^2 + \log 10^{-3} - \log 10^3 = 2 - 3 - 3 = -4$$

$$2) -\log 0.1 - \log 0.01 + \log 1000 = -\log 10^{-1} - \log 10^{-2} + \log 10^3 = -(-1) - (-2) + 3 = 6$$

تعريف 7: اللوغاريتم الطبيعي (أو النيبيري) هو اللوغاريتم ذو الأساس e حيث:

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \cong 2.71828$$

يرمز له بالرمز: $\ln x$

و كانت هناك جداول لحساب اللوغاريتمات الطبيعية ولكن يمكن استخدام الآلة الحاسبة أيضا.

مثال 16: باستخدام الآلة الحاسبة، قرب كلا مما يلي:

$$1) \ln 10, \quad 2) \ln 3.15, \quad 3) \ln \sqrt{2}$$

الحل:

$$1) \ln 10 \cong 2.3026$$

$$2) \ln 3.15 \cong 1.1474$$

$$3) \ln \sqrt{2} \cong 0.3466$$

نظرية 2: ليكن لدينا عدد حقيقي موجب $b \neq 1$ ومتغير حقيقي موجب x فإن:

$$1) b^x = e^{x \ln b}$$

$$2) \log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$$

ومن فوائد هذه النظرية أنها تسمح لنا بالانتقال من أي أساس إلى الأساس الطبيعي سواء بالنسبة للدوال الأسية أو الدوال اللوغاريتمية.

مثال 17: احسب كلا مما يلي:

$$1) \log_2 10, \quad 2) \log_5 \sqrt{2}, \quad 3) \log_{\sqrt{2}} 5$$

الحل:

$$1) \log_2 10 = \frac{\ln 10}{\ln 2} \cong \frac{2.3026}{0.6931} = 3.322$$

$$2) \log_5 \sqrt{2} = \frac{\ln \sqrt{2}}{\ln 5} \cong \frac{0.3466}{1.6094} = 0.215$$

$$3) \log_{\sqrt{2}} 5 = \frac{\ln 5}{\ln \sqrt{2}} \cong \frac{1.6094}{0.3466} = 4.643$$

2.4. المعادلة اللوغاريتمية:

نظرية 3: ليكن لدينا العددان الحقيقيان u و v فإن:

$$\ln u = \ln v \Leftrightarrow \begin{cases} u = v \\ u > 0 \\ v > 0 \end{cases}$$

قاعدة 1: من التعريف 7 لدينا:

$$\log_a x = y \Leftrightarrow x = a^y$$

صيغة أسية

قاعدة 2: ومن النظرية السابقة لنا:

إذا كان $x > 0, y > 0, b > 0, b \neq 1$ فإن:

$$\log_b x = \log_b y \Leftrightarrow x = y$$

ملاحظات:

- الأعداد التي لها لوغاريتم لأساس $a > 1$ هي الأعداد الحقيقية الموجبة.
- الأعداد الحقيقية السالبة ليس لها لوغاريتم

مثال 18: أوجد قيمة x إذا كانت:

$$1) \log_5 625 = x, \quad 2) \log_x 8 = 3,$$

$$3) \log_6 3x = \log_6(2x + 4), \quad 4) \log_4(x - 1) - \log_4 10 = \log_4(2x + 6) + \log_4 3.$$

الحل:

(1) نطبق القاعدة (1):

$$1) \log_5 625 = x \Leftrightarrow 625 = 5^x$$

$$\Leftrightarrow 5^4 = 5^x \therefore x = 4$$

(2) نطبق القاعدة (1)

$$2) \log_x 8 = 3 \Leftrightarrow 8 = x^3$$

$$\Leftrightarrow 2^3 = x^3$$

$$\therefore x = 2$$

(3) نطبق القاعدة (2)

$$3) \log_6 3x = \log_6(2x + 4) \Rightarrow 3x = 2x + 4$$

$$\therefore x = 4$$

$$4) \log_4(x - 1) - \log_4 10 = \log_4(2x + 6) + \log_4 3,$$

$$\Rightarrow \log_4\left(\frac{x-1}{10}\right) = \log_4 3(2x + 6)$$

$$\Rightarrow \log_4\left(\frac{x-1}{10}\right) = \log_4(6x + 18)$$

نطبق القاعدة (2):

$$\therefore \frac{x-1}{10} = 6x + 18 \Rightarrow x - 1 = 60x + 180$$

$$\Rightarrow 59x = -181 \Rightarrow x = \frac{-181}{59}$$

ولكن $x = \frac{-181}{59}$ مرفوض لأنه لا يحقق المعادلة الأصلية

\therefore مجموعة الحل هي \emptyset

5. المعادلات الأسية واللوغاريتمية :

في هذه الفقرة سنتطرق إلى حل المعادلات التي تحتوي على الأسس أ و اللوغاريتمات بالانتقال من المعادلات الأسية إلى المعادلات اللوغاريتمية أو العكس حسب ما يقتضيه تسهيل المسألة.

مثال 19 : حل المعادلات التالية :

$$1) 5^{3x-2} = 4, \quad 2) \left(\frac{1}{2}\right)^{3x+1} = 9^{2x-3}, \quad 3) \left(\frac{4}{5}\right)^{x^2+2x-1} = \frac{25}{16}$$

الحل :

$$1) 5^{3x-2} = 4 \Leftrightarrow \ln 5^{3x-2} = \ln 4 \Leftrightarrow (3x-2)\ln 5 = \ln 4 \Leftrightarrow 3x-2 = \frac{\ln 4}{\ln 5}$$

$$\Leftrightarrow 3x = \frac{\ln 4}{\ln 5} + 2 \Leftrightarrow x = \frac{\frac{\ln 4}{\ln 5} + 2}{3} \cong 0.954$$

$$2) \left(\frac{1}{2}\right)^{3x+1} = 9^{2x-3} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{1}{2}\right)^{3x+1} = \ln 9^{2x-3} \Leftrightarrow (3x+1)\ln \frac{1}{2} = (2x-3)\ln 9$$

$$\Leftrightarrow 3x\ln \frac{1}{2} + \ln \frac{1}{2} = 2x\ln 9 - 3\ln 9 \Leftrightarrow 3x\ln \frac{1}{2} - 2x\ln 9 = -3\ln 9 - \ln \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow x(3\ln \frac{1}{2} - 2\ln 9) = -3\ln 9 - \ln \frac{1}{2} \Leftrightarrow x(-3\ln 2 - 2\ln 9) = -3\ln 9 + \ln 2$$

$$\Leftrightarrow x = -\frac{-3\ln 9 + \ln 2}{3\ln 2 + 2\ln 9} \cong 0.911$$

$$3) \left(\frac{4}{5}\right)^{x^2+2x-1} = \frac{25}{16} \Leftrightarrow \ln\left(\frac{4}{5}\right)^{x^2+2x-1} = \ln \frac{25}{16} \Leftrightarrow (x^2+2x-1)\ln \frac{4}{5} = \ln\left(\frac{4}{5}\right)^{-2}$$

$$\Leftrightarrow x^2+2x-1 = \frac{\ln\left(\frac{4}{5}\right)^{-2}}{\ln \frac{4}{5}} \Leftrightarrow x^2+2x-1 = \frac{-2\ln \frac{4}{5}}{\ln \frac{4}{5}} \Leftrightarrow x^2+2x-1 = -2$$

$$\Leftrightarrow x^2+2x-1+2=0 \Leftrightarrow x^2+2x+1=0 \Leftrightarrow (x+1)^2=0 \Leftrightarrow x+1=0 \Leftrightarrow x=-1$$

مثال 20 : حل المعادلات التالية :

$$1) \ln x = 2, \quad 2) \ln(3x-5) = 5, \quad 3) \ln(x-2) + \ln(x+3) = \ln 2$$

الحل :

$$1) \ln x = 2 \Leftrightarrow \ln x = \ln e^2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = e^2 \\ x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = e^2 \cong 7.389$$

$$2) \ln(3x - 5) = 5 \Leftrightarrow \ln(3x - 5) = \ln e^5 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 5 = e^5 \\ 3x - 5 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow 3x = e^5 + 5 \Leftrightarrow x = \frac{e^5 + 5}{3} \cong 51.138$$

$$3) \ln(x - 2) + \ln(x + 3) = \ln 2 \Leftrightarrow \begin{cases} \ln(x - 2)(x + 3) = \ln 2 \\ x - 2 > 0 \\ x + 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x - 2)(x + 3) = 2 \\ x - 2 > 0 \\ x + 3 > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 6 = 2 \\ x - 2 > 0 \\ x + 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 6 - 2 = 0 \\ x - 2 > 0 \\ x + 3 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + x - 8 = 0 \\ x - 2 > 0 \\ x + 3 > 0 \end{cases}$$

نحل المعادلة: $x^2 + x - 8 = 0$.

نحسب المميز: $\Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - (4 \times 1 \times -8) = 33 > 0$

إذن للمعادلة جذران حقيقيان هما:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 - \sqrt{33}}{2 \times 1} \cong -3.372$$

$$x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{33}}{2 \times 1} \cong 2.372$$

نتحقق من شروط المعادلة (المتراجحتان):

بالنسبة للجذر الأول: $x_1 - 2 = -5.372 < 0$ إذن الجذر مرفوض.

بالنسبة للجذر الثاني: $x_2 - 2 = 0.372 > 0$ و $x_2 + 3 = 5.372 > 0$ إذن الجذر مقبول.

$$\text{خلاصة: الحل هو: } x = \frac{-1 + \sqrt{33}}{2} \cong 2.372$$

تمارين

تمرين 1: اختر الإجابة الصحيحة في ما يلي:

1	نتاج القيمة 2^5 هو a) 2×5 b) $\frac{1}{32}$ c) -10 d) $2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$
2	نتاج القيمة 3^{-3} هو a) -3×3 b) $\frac{1}{27}$ c) -27 d) $\sqrt[3]{-3}$
3	نتاج القيمة $(-9)^2$ هو a) 81 b) -9×2 c) -9×9 d) $\frac{1}{81}$
4	نتاج القيمة $\sqrt[4]{-16}$ هو a) 0 b) -2 c) 3 d) لا يمكن حسابها
5	من الممكن كتابة الجذر $(\sqrt[3]{64})^{-2}$ على الشكل a) $(64)^{\frac{3}{-2}}$ b) $(64)^{-6}$ c) $\frac{1}{(\sqrt[3]{64})^2}$ d) $\frac{1}{64}$
6	نتاج القيمة $(-6)^2$ هو a) $\frac{1}{36}$ b) -6×2 c) -6×6 d) 36
7	هو $\sqrt[5]{-32}$ ناتج القيمة a) 0 b) -2 c) 3 d) لا يمكن حسابها
8	نتاج القيمة 4^2 هو a) 2×4 b) $2 \times 2 \times 2 \times 2$ c) 16 d) $\frac{1}{16}$
9	نتاج القيمة $\sqrt[3]{-8}$ هو a) 0 b) -2 c) 3 d) لا يمكن حسابها

تمرين 2: بسط كلا مما يلي:

$$1) \frac{\sqrt[3]{x^2 y^6}}{\sqrt[6]{x^2 y^{18}}}, \quad 2) \frac{2x^{-5}}{15y^3} \times \frac{3^2 x^3 y}{10}, \quad 3) \left(\frac{-2x^6 z}{x^{-2} y^3} \right)^3 \left(\frac{y^6}{10x^2 y^3 z} \right)^2,$$

$$4) \frac{x^4 y^3}{z^2} \times \left(\frac{z^5 x^{-2}}{y^4} \right)^2, \quad 5) \frac{\sqrt[4]{x^2 z^3}}{\sqrt[3]{y^5 x^3}} \times \frac{\sqrt{y^4 z^{-5}}}{\sqrt[6]{x^8}}.$$

تمرين 3: بسط كلا مما يلي:

$$1) \frac{2^{x+1}}{2^{x-1}}, \quad 2) \frac{3^{1-2x}}{6^{x+2}} \times \frac{2^{x+3}}{8}, \quad 3) (e^{2x})^3 (1 - 2e^x)^2.$$

تمرين 4: بسط كلا مما يلي:

$$1) \log_2(x+1) - \log_2(x^2 + 2x + 1), \quad 2) \ln(x+3) - 2\ln(1-x) + 4\ln x$$

$$3) \log_5 e^{x+1} - \log_3 e^{2-x}, \quad 4) \log_9(x^2 - 1) - \log_3(x+1).$$

تمرين 5: حل المعادلات التالية:

$$1) \sqrt[3]{x^2} = 4, \quad 2) x^{-5} = 2x^3, \quad 3) -2x^6 = x^{-2}.$$

تمرين 6: حل المعادلات التالية:

$$1) \sqrt[3]{x^2} = 4, \quad 2) x^{-5} = 2x^3, \quad 3) -2x^6 = x^{-2}.$$

تمرين 7: حل المعادلات التالية:

$$1) 2^x = 5^{x+1}, \quad 2) \sqrt[3]{3} = 3^x, \quad 3) \frac{2^{-x+2}}{6^x} = 3^{x+1}, \quad 4) e^{-x+3} = 5.$$

تمرين 8: حل المعادلات التالية:

$$1) \ln x + \ln(2-x) = 0, \quad 2) -\ln(x+3) + \ln(-x+2) = \ln 4, \quad 3) \ln(x+6) = \ln(2x-1).$$

تمرين 9: حل المعادلات التالية:

$$1) \log_2 x + \log_2(2-x) = 0, \quad 2) -\log_3(x+5) + \log_3(-x+1) = \log_3 2,$$

$$3) \log(x-6) = \log(-2x+3), \quad 4) \log x = 3, \quad 5) \log_2(x+3) + \log_5(x-2) = 0.$$

رياضيات تخصصية

مفهوم الدالة ومنحناها

اسم الوحدة: مفهوم الدالة ومنحناها

الجدارة: معرفة مفهوم الدالة وأنواعها وبعض الدوال العددية المشهورة والقدرة على تمثيل منحنياتها.

الأهداف: بعد دراسة هذه الوحدة يكون للمتدرب القدرة على معرفة:

- الدوال من غيرها وتحديد مجالها ومداهما
- بعض الدوال الجبرية المشهورة.
- الدوال المثلثية الأساسية.
- الدوال الأسية واللوغاريتمية.
- تمثيل منحنيات بعض الدوال.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة 80%.

الوقت المتوقع للتدريب: ثمان ساعات..

مفهوم الدالة ومنحناها

استخدمت الدوال منذ القدم ولكنها لم تدرس كمفهوم رياضي إلا حديثاً. ومن تطبيقاتها: الدوال العددية المشهورة التي تدخل في كثير من القوانين التجريبية، وكذلك الدوال الخاصة بالبرمجة في الحاسوب.

1. تعريف الدالة:

تعريف 1: تكون علاقة f من مجموعة X إلى مجموعة Y دالة إذا كان كل عنصر من X في علاقة مع عنصر واحد على الأكثر من Y ، أي أنه من أجل أي عنصرين x_1 و x_2 من X هما في علاقة مع عنصرين من Y يكون:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

حيث أن $f(x)$ يمثل العنصر الذي هو في علاقة مع x .

نسمي المجموعة X مجموعة المنطلق والمجموعة Y مجموعة الوصول والعنصر $y = f(x)$ صورة x بواسطة الدالة f والعنصر x أصل $y = f(x)$ بواسطة الدالة f ونقول أن $f(x)$ غير معرفة في Y إذا كان x ليس في علاقة مع أي عنصر من Y أي أن $f(x)$ غير موجود في Y .

نرمز لهذه الدالة بالرمز: $f : X \rightarrow Y$

تجدر الإشارة إلى أن كل عنصر من مجموعة المنطلق له صورة واحدة على الأكثر، بينما قد يكون هناك عنصر من مجموعة الوصول له عدة أصول.

مثال 1: لتكن لدينا المجموعتان التاليتان:

$$X = \{0,1,2,3\} \text{ و } Y = \{2,4,6,8\}$$

من X إلى Y بحيث:


$$f(1) = 2, f(2) = 4, f(3) = 6$$

العلاقة f دالة لأن كل عنصر من X في علاقة مع عنصر واحد على الأكثر من Y .

يمكن تمثيل هذه الدالة بالمخطط السهمي التالي:

كما يمكن تعريف هذه الدالة كالتالي:

$$f : X \rightarrow Y \text{ حيث: } f(x) = 2x$$



مثال 2: لتكن لدينا المجموعتان التاليتان: $X = \{0,1,-1,2,-2,5\}$ و $Y = \{0,1,4,9,-2\}$ والعلاقة f من X إلى Y بحيث:

$$f(0) = 0, f(1) = f(-1) = 1, f(2) = f(-2) = 4$$

العلاقة f دالة لأن كل عنصر من X في علاقة مع عنصر واحد على الأكثر من Y :
العناصر 0 و 1 و -1 و 2 و -2 في علاقة مع عنصر واحد فقط من Y بينما العنصر 5 ليس في علاقة مع أي عنصر من Y أي أن $f(5)$ غير معرفة في Y .

يمكن تمثيل هذه الدالة بالمخطط السهمي التالي:


كما يمكن تعريف هذه الدالة كالتالي:

$$f: X \rightarrow Y$$

$$f(x) = x^2 \text{ حيث:}$$

ويمكن في هذه الحالة أن نبين بأن f هي دالة باستخدام العلاقة الموجودة في التعريف 1:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow (x_1)^2 = (x_2)^2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$



مثال 3: لتكن لدينا المجموعتان التاليتان: $Cities$ وهي مجموعة مدن العالم، و $Countries$ وهي

مجموعة بلدان العالم والعلاقة f من $Cities$ إلى $Countries$ بحيث: x هو عاصمة $f(x)$.

العلاقة f دالة لأن كل عنصر x من $Cities$ وهو مدينة من المدن في علاقة مع عنصر واحد على الأكثر من $Countries$

إذا كان x عاصمة من العواصم فهو في علاقة مع بلده الموافق، وإذا كان x ليس عاصمة فهو ليس في علاقة مع أي عنصر من $Countries$. مثلاً:

$$f(Riyadh) = Saudi Arabia$$

$$f(Algiers) = Algeria$$

$$f(Cairo) = Egypt$$

$$f(London) = United Kingdom$$

بينما $f(Abha)$ ليست معرفة في $Countries$ لأن $Abha$ ليست عاصمة دولة.

مثال 4: لتكن لدينا المجموعتان السابقتان: $Cities$ و $Countries$ والعلاقة g من $Cities$ إلى $Countries$ بحيث: $g(x)$ هو البلد الذي توجد فيه المدينة x .
العلاقة g دالة لأن كل عنصر x من $Cities$ وهو مدينة من المدن في علاقة مع عنصر واحد على الأكثر من $Countries$. مثلاً:

$$g(Riyadh) = Saudi Arabia$$

$$g(Algiers) = Algeria$$

$$g(Cairo) = Egypt$$

$$g(London) = United Kingdom$$

$$g(Abha) = Saudi Arabia$$

مثال 5: لتكن لدينا المجموعتان السابقتان $Countries$ و $Cities$ والعلاقة f من $Countries$ إلى $Cities$ بحيث: $f(x)$ هو مدينة من البلد x .

هذه العلاقة ليست دالة لأنه مثلاً: البلد $Saudi Arabia$ في علاقة مع أكثر من مدينة واحدة.

تعريف 2: مجال الدالة f (أو مجموعة تعريفها) هو مجموعة العناصر الموجودة في مجموعة المنطلق والتي لها صورة بواسطة الدالة، ومدى الدالة f هو مجموعة العناصر الموجودة في مجموعة الوصول والتي لها أصول بواسطة الدالة.

يرمز لمجال الدالة f بالرمز D_f ولداها بالرمز R_f .

مثال 6: حدد مجال الدوال المعرفة في الأمثلة 1 إلى 4 ومداهما.

الحل:

$$1) D_f = \{1,2,3\}, \quad R_f = \{2,4,6\}$$

$$2) D_f = \{0,1,-1,2,-2\}, \quad R_f = \{0,1,4\}$$

(3) لو نعتبر مجموعة العواصم $Capitals$ فيكون:

$$D_f = Capitals \quad R_f = Countries$$

$$4) D_g = Cities \quad R_g = Countries$$

مثال 7: لتكن لدينا مجموعة الأعداد الطبيعية N والعلاقة f من N إلى N بحيث: $f(x) = 2x$.

(1) بين أن f دالة. (2) حدد مجال f ومداهما. (3) احسب $f(5)$ و $f(14)$.

الحل:

(1) f دالة لأن:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

(2) كل عدد طبيعي له صورة بواسطة f إذن: $D_f = \mathbb{N}$

بينما الأعداد الزوجية فقط هي التي لها أصول في \mathbb{N} : $R_f = \{2,4,6,8,10,\dots\}$

$$(3) \quad f(5) = 2 \times 5 = 10 \quad \text{و} \quad f(14) = 2 \times 14 = 28 .$$

مثال 8: لتكن لدينا مجموعة الأعداد الحقيقية \mathbb{R} والعلاقة g من \mathbb{R} إلى \mathbb{R} بحيث: $f(x) = 2x$.

(1) بين بأن g دالة. (2) حدد مجال g ومداهها. (3) احسب $g(2.5)$ و $g(5)$.

الحل:

(1) دالة لأن:

$$x_1 = x_2 \Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow g(x_1) = g(x_2)$$

(2) كل عدد حقيقي له صورة بواسطة g إذن: $D_g = \mathbb{R}$

وكذلك كل الأعداد الحقيقية لها أصول في \mathbb{R} إذن: $R_g = \mathbb{R}$ لأن:

$$y = 2 \times \frac{y}{2} = 2 \left(\frac{y}{2} \right) = g \left(\frac{y}{2} \right)$$

مثلا: $3 = g(1.5)$ و $0.6 = g(0.3)$.

$$(3) \quad g(2.5) = 2 \times 2.5 = 5 \quad \text{و} \quad g(5) = 2 \times 5 = 10 .$$

تعريف 3: تكون دالتان f و g متساويتين إذا تحقق ما يلي:

$$1) D_f = D_g$$

$$2) x \in D_f \Rightarrow f(x) = g(x)$$

نرمز لذلك بالرمز: $f = g$.

مثال 9: هل الدالتان f و g المعرفتان في المثالين 3 و 4 على الترتيب متساويتان؟

الحل:

باستخدام نتائج الفقرتين 3 و 4 من المثال 6 فإن: $f \neq g$ لأن مجاليهما غير متساويين:

$$D_f = \text{Capitals} \neq D_g = \text{Cities}$$

مثال 10: هل الدالتان f و g المعرفتان في المثالين 7 و 8 على الترتيب متساويتان؟

الحل:

باستخدام نتائج المثالين 7 و 8 فإن: $f \neq g$ لأن مجاليهما غير متساويين:

$$D_f = \mathbb{N} \neq D_g = \mathbb{R}$$

مثال 11: لتكن لدينا الدالة التالية:

$$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \quad \text{حيث} \quad g(x) = x^2$$

ونعتبر الدالة f المعرفة في المثال 7. هل $f = g$ ؟

الحل:

رغم أن الشرط الأول للتساوي (تعريف 3) متحقق وهو: $D_f = N = D_g$
 لكن الشرط الثاني غير متحقق: مثلاً $3 \in D_f = N$ لكن $f(3) = 2 \times 3 = 6 \neq g(3) = 3^2 = 9$
 ومنه فإن: $f \neq g$.

2. الدوال العددية:

تعريف 4: الدوال العددية هي الدوال التي تكون مجموعة وصولها مجموعة عددية.

مثال 12: كل الدوال التالية هي دوال عددية.

$$1) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x + 1$$

$$2) f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x + 1$$

$$3) f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = \sqrt{x}$$

$$4) f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt{x}$$

تعريف 5: نقول عن دالة إنها:

(1) فردية إذا كان: $f(-x) = -f(x)$ أو $f(-x) + f(x) = 0$ من أجل أي $x \in D_f$ و $-x \in D_f$.

(2) زوجية إذا كان: $f(-x) = f(x)$ أو $f(-x) - f(x) = 0$ من أجل أي $x \in D_f$ و $-x \in D_f$.

مثال 13: هل الدوال المعرفة في المثال السابق فردية أم زوجية أم غير ذلك؟

الحل:

(1) الدالة $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $f(x) = x + 1$ ليست فردية ولا زوجية لأن:

$$f(-x) + f(x) = (-x) + 1 + x + 1 = 2 \neq 0$$

$$f(-x) - f(x) = (-x) + 1 - (x + 1) = -x + 1 - x - 1 = -2x \neq 0$$

الدالة $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $g(x) = x^2$ زوجية لأن:

$$g(-x) - g(x) = (-x)^2 - x^2 = x^2 - x^2 = 0$$

(2) الدالة $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ حيث $f(x) = x + 1$ ليست فردية ولا زوجية لأنه إذا كان $x \in D_f = \mathbb{N}$ فإن

$$-x \notin D_f$$

الدالة $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ حيث $g(x) = x^2$ ليست فردية ولا زوجية لسبب مماثل للسبب السابق.

(3) الدالة $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ حيث $f(x) = \sqrt{x}$ ليست فردية ولا زوجية لأنه إذا كان $x \in D_f = \mathbb{N}$ فإن

$$-x \notin D_f$$

4) الدالة $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $f(x) = \sqrt{x}$ ليست فردية ولا زوجية لأن مجالها لا يحتوي على الأعداد السالبة (السبب السابق).

3. معنى الدالة:

يمكن تمثيل الدوال العددية التي يكون مجالها مجموعة عددية فيما يسمى بالمستوى الديكارتي وذلك بإتباع الخطوات التالية:

- 1) إنشاء جدول لقيم x (المعرفة) مرتبة من أصغرها إلى أكبرها وقيم $y = f(x)$ الموافقة لها.
- 2) رسم النقاط (x, y) الناتجة في المستوى الديكارتي.
- 3) وصل النقاط بعضها ببعض حسب ترتيبها بقطع مستقيمة إذا كانت القيم الموافقة للعنصر x لها صورة.


مثال 14: مثل الدالة التالية: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $f(x) = \sqrt{x}$.

الحل:


الخطوة الأولى: إنشاء جدول القيم:

x	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25
$y = \sqrt{x}$	0.00	0.50	0.71	0.87	1.00	1.12	1.22	1.32	1.41	1.50

الخطوة الثانية: رسم النقاط الناتجة:



الخطوة الثالثة: وصل النقاط بقطع مستقيمة:



تجدر الإشارة إلى أنه كلما كان جدول القيم أكثر دقة وأكثر قيما كلما كان التمثيل أدق.. وهذا التمثيل يعطي لنا جزءا مما يسمى منحنى الدالة.

4. دوال خاصة

1.4 الدوال الجبرية:

تعريف 5: الدوال الجبرية هي الدوال التي يمكن تعريفها باستخدام كثيرات الحدود وعمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة (المطولة).

وهي نوعان: كثيرات الحدود وهي التي نستخدم فيها الجمع والطرح والضرب فقط، والدوال الكسرية وهي التي نستخدم فيها العمليات السابقة والقسمة أيضا. ومن الدوال الجبرية: الدالة الثابتة والدالة الخطية والدالة التربيعية والدالة الكسرية.

(1) **الدالة الثابتة:** وهي من الشكل: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $y = f(x) = a$ و a عدد حقيقي ثابت. ومن خواصها:

$$(1) D_f = \mathbb{R} \text{ أي أنها معرفة لكل عدد حقيقي.}$$


$$(2) R_f = \{a\} \text{ أي أنها تقبل قيمة واحدة فقط.}$$

$$(3) f(-x) = f(x) \text{ أي أنها زوجية.}$$

(4) يمكن تمثيلها بخط مستقيم يوازي محور السينات.

مثال 15: مثل الدالة التالية: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $f(x) = -\sqrt{2}$.

الحل:



(2) **الدالة الخطية:** وهي من الشكل: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $y = f(x) = ax + b$ و a, b عدنان حقيقيان ثابتان و $a \neq 0$ أي أنها كثير حدود من الدرجة الأولى.

ومن خواصها:

(1) $D_f = \mathbb{R}$ أي أنها معرفة لكل عدد حقيقي.


(2) $R_f = \mathbb{R}$ أي أنها تقبل كل القيم الحقيقية..

(3) ليست فردية ولا زوجية.

(4) يمكن تمثيلها بخط مستقيم مائل يمر من نقطة المبدأ إذا كانت $b = 0$ و بخط مستقيم مائل يمر من النقطة $(0, b)$ إذا كانت $b \neq 0$.


مثال 16: مثل الدالة التالية: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $f(x) = -\sqrt{2}x$.

الحل:



مثال 17: مثل الدالة التالية: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $f(x) = -\sqrt{2}x + 1.5$.

الحل:




(4) **الدالة التربيعية:** وهي من الشكل: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $y = f(x) = ax^2 + bx + c$ و $a \neq 0$ و b و c أعداد حقيقية ثابتة أي أنها كثير حدود من الدرجة الثانية.

ومن خواصها:

- (1) $D_f = \mathbb{R}$ أي أنها معرفة لكل عدد حقيقي.
- (2) $R_f \neq \mathbb{R}$ أي أنها لا تقبل كل القيم الحقيقية..
- (3) ليست فردية ولا زوجية ولكنها زوجية إذا كان $b = 0$.
- (4) يمكن تمثيلها بقطع مخروطي زائد يمر من نقطة المبدأ إذا كان $b = c = 0$.

مثال 18: مثل الدالة التالية: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $f(x) = -\sqrt{2}x^2 + 1.5$.

الحل:



(4) **الدالة الكسرية:** وهي عبارة عن كسر بسطه ومقامه كثيرات حدود.

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1} \text{ حيث } f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

ومن خواصها:

(1) $D_f = \mathbb{R} - \{1\}$ أي أنها ليست معرفة لكل عدد حقيقي.

(2) $R_f = \mathbb{R} - \{2\}$ أي أنها لا تقبل كل القيم الحقيقية..


(3) ليست فردية ولا زوجية.

(4) يمكن تمثيلها بقطع مخروطي مكافئ لا يمر من نقطة المبدأ.

مثال 19: مثل الدالة التالية: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث

$$f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$$

الحل:



2.4 الدوال غير الجبرية:

أما الدوال غير الجبرية فمنها: الدوال المثلثية والدوال الأسية والدوال اللوغاريتمية.

1.2.4 الدوال المثلثية

تعريف 6: الدوال المثلثية هي الدوال التي تكون معرفّة على الزوايا. ونقيس الزوايا بوحدّة الراديان

(الوحدة القياسية) أو بالدرجات (التي رمزها °) وعلاقة التحويل بين هاتين الوحدتين هي: $\pi = 180^\circ$

ومن الدوال المثلثية: دالة الجيب ودالة جيب التمام ودالة الظل ودالة قاطع التمام ودالة القاطع.

تعريف 7: نقول عن دالة $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ إنها دورية ذات دور $p > 0$ إذا كان: $f(x+p) = f(x)$ من أجل

أي عدد حقيقي $x \in D_f$ (و p أصغر ما يمكن)، أي أن قيم الدالة تتكرر بشكل منتظم

تعريف 7: إذا كان لدينا مثلث قائم الزاوية وكان x مقياس أحد زاويتيّه غير القائمتين فإن:

$\sin x$ هو حاصل قسمة طول الضلع المقابل للزاوية غير الوتر على طول الوتر،

و $\cos x$ هو حاصل قسمة طول الضلع المجاور للزاوية غير الوتر على طول الوتر.

و $\tan x$ هو حاصل قسمة طول الضلع المقابل للزاوية على طول الضلع المجاور للزاوية غير الوتر

و $\cot x$ هو حاصل قسمة طول الضلع المجاور للزاوية غير الوتر على طول الضلع المقابل للزاوية

(1) **دالة الجيب:** ويرمز لها بالرمز: \sin وهي من الشكل: $\sin : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $y = \sin x$. معمة لمقياس أية زاوية.

ومن خواصها:


$$(1) D_f = \mathbb{R} \text{ أي أنها معرفة لكل عدد حقيقي.}$$

$$(2) R_f = [-1, 1] \text{ أي أنها لا تقبل كل القيم الحقيقية ولكن: } -1 \leq \sin x \leq 1$$

$$(3) \sin(-x) = -\sin x \text{ أي أنها فردية.}$$

$$(4) \sin(x + 2\pi) = \sin x \text{ أي أنها دورية ذات دور } 2\pi .$$

(5) يمكن تمثيلها بموجة تمر من نقطة المبدأ كما هو موضح بالرسم التالي:



(2) **دالة جيب التمام:** ويرمز لها بالرمز: \cos وهي من الشكل: $\cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $y = \cos x$. معمة لمقياس أية زاوية.

ومن خواصها:


$$(1) D_f = \mathbb{R} \text{ أي أنها معرفة لكل عدد حقيقي.}$$

$$(2) R_f = [-1, 1] \text{ أي أنها لا تقبل كل القيم الحقيقية ولكن: } -1 \leq \cos x \leq 1$$

$$(3) \cos(-x) = \cos x \text{ أي أنها زوجية.}$$

$$(4) \cos(x + 2\pi) = \cos x \text{ أي أنها دورية ذات دور } 2\pi .$$

(5) يمكن تمثيلها بموجة لا تمر من نقطة المبدأ كما هو موضح بالرسم التالي.



2.2.4 الدوال الأسية: وهي من الشكل: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $y = f(x) = b^x$ و $b \neq 1$ عدد حقيقي موجب ثابت.

ومن خواصها:

(1) $D_f = \mathbb{R}$ أي أنها معرفة لكل عدد حقيقي.

(2) $R_f = [0, \infty)$ أي أنها لا تقبل كل القيم الحقيقية ولكن: $b^x > 0$.

(3) ليست فردية ولا زوجية.


(4) ومن حالاتها الخاصة كثيرة الاستعمال: دالة الأساس الطبيعي $y = e^x$ حيث $e \cong 2.71828$ وهي متزايدة بسرعة أي أن قيمها تكبر بسرعة، وتقترب من الصفر كلما كانت قيم x سالبة.

(5) قانون تغيير الأساس للدوال الأسية: $b^x = e^{x \ln b}$.

(6) يمكن تمثيلها بتحديد قيمة للعدد b .

مثال 20: مثل الدالة التالية: $y = e^x$.

الحل:



3.2.4 الدوال اللوغاريتمية: ويرمز لها بالرمز: \log_b وهي من الشكل: $\log_b: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ حيث $y = \log_b x$ إذا كان $x = b^y$ و $b \neq 1$ عدد حقيقي موجب ثابت..

ومن خواصها:

(1) $\log_b(b^x) = x$ و $b^{\log_b x} = x$ أي أنها تسمح لنا بالتخلص من الدالة الأسية الموافقة لها والعكس.

(2) $D_f = (0, \infty)$ أي أنها ليست معرفة إلا للأعداد الموجبة.

(3) $R_f = \mathbb{R}$ أي أنها تقبل كل القيم الحقيقية.

(4) ليست فردية ولا زوجية.


(5) ومن حالاتها الخاصة كثيرة الاستعمال: دالة اللوغاريتم الطبيعي $y = \ln x = \log_e x$ حيث $e \cong 2.71828$ وهي متزايدة ببطء أي أن قيمها تكبر ببطء ولذلك تستخدم لتمثيل الأعداد الكبيرة. وكذلك تتجه قيمها إلى الأعداد السالبة الصغيرة جدا كلما صغرت قيم x .

(6) قانون تغيير الأساس للدوال اللوغاريتمية: $\log_b x = \frac{\ln x}{\ln b}$.

(7) يمكن تمثيلها بتحديد قيمة للعدد b .

مثال 21: مثل الدالة التالية: $y = \ln x$.

الحل:



تمارين

تمرين 1: بين أن كلا من العلاقات التالية دوال:

- 1) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = x^3$, 2) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = \sqrt[3]{x}$,
3) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^3 + 1$, 4) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sqrt[3]{x} - 1$

تمرين 2: حدد مجال كل دالة من التمرين 1 ومداهما:

تمرين 4: هل كل مما يلي دالة فردية أم زوجية أم غير ذلك؟

- 1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin 2x$ 2) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$
3) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{|x|}$ 4) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$.

تمرين 5: مثل كلا من الدوال التالية:

- 1) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \sin 2x$ 2) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{x}$
3) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = e^{|x|}$ 4) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = |x|$

تمرين 6: بين أن الدوال التالية دورية وحدد دورها:

- 1) $\sin 2x$, 2) $\cos \frac{1}{4}x$, 3) $\sin 2x - \cos \frac{1}{4}x$, 4) $\sin 5x + 2\cos 3x$.

رياضيات تخصصية

المتتابعات و طرق العد

اسم الوحدة: المتتابعات وطرق العد

الجدارة: الالمام بطرق العد ومفهوم المتتابعات والمتسلسلات المنتهية

الأهداف:

بعد دراسة هذه الوحدة يكون للطالب القدرة على:

- التعبير عن المتتابعات المنتهية واللامنتهية وتمثيلها بالشكل.
- ايجاد قيم المتتابعات الحسابية والهندسية.
- حساب الأوساط الحسابية والهندسية.
- تطبيق القاعدة الأساسية لطرق العد.
- حل المسائل باستخدام التباديل والتوافيق.
- ايجاد المفكوك باستعمال قانون ثنائي الحد.

مستوى الأداء المطلوب: أن يصل المتدرب إلى إتقان هذه الوحدة بنسبة 80% .

الوقت المتوقع للتدريب: ستة ساعات للفصل الأول وستة ساعات للفصل الثاني، بحيث يكون الوقت الكلي اثنتي عشر ساعة.

الفصل الأول: المتتابعات

1. المتتابعات

تعريف

المتتابعة هي دالة s مجالها مجموعة الأعداد الطبيعية N أو مجموعة جزئية من N ومداهها مجموعة جزئية من \mathbb{R} وعناصرها تسمى حدود المتتابعة.
وإذا كانت $n \in N$ فإن $a(n)$ تسمى الحد النوني للمتتابعة.

ملاحظات

(1) المتتابعة s يمكن التعبير عنها بالطرق التالية:

(أ) نظرا لأن مجال أية متتابعة هو N أو مجموعة جزئية من N فإنه يمكن أن نكتفي بكتابة حدود المتتابعة أي نكتب:

$$a(1), a(2), a(3), \dots, a(n), \dots$$

نلاحظ أنه متى علمنا الحد النوني $a(n)$ فإن المتتابعة تكون معروفة تماما. فمثلا إذا كان الحد النوني لمتتابعة s هو $2n$ فإننا نكتب المتتابعة كما يلي:

$$2, 4, 6, 8, \dots, 2n, \dots \quad (1)$$

و إذا كان الحد النوني لمتتابعة s هو $\frac{2n}{2n+1}$ فإننا نكتب المتتابعة كما يلي:

$$\frac{2}{3}, \frac{4}{5}, \frac{6}{7}, \frac{8}{9}, \dots, \frac{2n}{2n+1}, \dots \quad (2)$$

(ب) إذا اتفقنا على استخدام الرمز a_n للدلالة على الحد النوني للمتتابعة s فإنه يمكن استخدام الرمز $\{a_n\}$ للتعبير عن المتتابعة s التي حدها النوني a_n وتبعا للطريقة (أ) السابقة فإن s تكتب كالتالي:

$$a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$$

فمثلا المتتابعة (1) يمكن كتابتها بالصورة: $\{2n\}$ لأن حدها النوني هو $2n$

والمتتابعة (2) يمكن كتابتها بالصورة: $\left\{ \frac{2n}{2n+1} \right\}$ لأن حدها النوني هو $\frac{2n}{2n+1}$

وهكذا فإن الرموز $\{a_n\}, \{b_n\}, \{c_n\}, \dots$ تعني متتابعات حدودها النونية هي a_n, b_n, c_n, \dots على الترتيب.

(ج) حيث إن المتتابعة s دالة فإنه يمكن كتابة s كمجموعة أزواج مرتبة كما يلي:

$$s = \{(n, a_n) : n \in N\}$$

$$\{(n, 2n): n \in \mathbb{N}\}$$

فالمتتابعة (1) يمكن كتابتها على الصورة:

$$\left\{ \left(n, \frac{2n}{2n+1} \right) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

والمتتابعة (2) يمكن كتابتها على الصورة:

وتمثيلها بيانيا بواسطة نقاط في المستوى الإحداثي.

(2) ليس من الضروري وجود قانون معين للحد النوني لكل متتابعة، فمثلا متتابعة الأعداد الأولية:

$$2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots$$

ليس لها قانون معين يعطي الحد النوني لها. وفي مثل هذه الحالة يجب كتابة العناصر كلها أو ذكر صفات هذه العناصر.

(3) من تعريف التساوي بين الدوال تكون المتابعتان $\{a_n\}, \{b_n\}$ متساويتين إذا تحقق الشرط التالي:

$$a_n = b_n \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

$$a_1 = b_1, a_2 = b_2, a_3 = b_3, \dots$$

أي أن:

$$1, 4, 9, 16, 25, \dots$$

مثال 1: المتتابعة

$$a_1 = 1 = 1^2 \quad \text{حدها الأول}$$

هي متتابعة:

$$a_2 = 4 = 2^2 \quad \text{حدها الثاني}$$

$$a_3 = 9 = 3^2 \quad \text{حدها الثالث}$$

$$\dots, a_4 = 16 = 4^2 \quad \text{حدها الرابع}$$

$$a_n = n^2$$

وهكذا فيكون حدها النوني:

ويمكن التعبير عن هذه المتتابعة باستخدام الرمز $\{n^2\}$ ، كما أنه يمكن كتابتها كمجموعة الأزواج المرتبة:

$$\{(n, n^2): n \in \mathbb{N}\}$$

$$1, -4, 9, -16, 25, -36, \dots$$

مثال 2: المتتابعة

$$a_1 = 1 = (-1)^{1+1} \times 1^2 \quad \text{حدها الأول}$$

هي متتابعة:

$$a_2 = -4 = (-1)^{1+2} \times 2^2 \quad \text{حدها الثاني}$$

$$a_3 = 9 = (-1)^{1+3} \times 3^2 \quad \text{حدها الثالث}$$

$$\dots, a_4 = -16 = (-1)^{1+4} \times 4^2 \quad \text{حدها الرابع}$$

$$a_n = (-1)^{n+1} n^2$$

وهكذا فيكون حدها النوني:

ولذلك يمكن التعبير عنها بالصورة: $\{(-1)^{n+1} n^2\}$ كما أنه يمكن كتابتها كمجموعة الأزواج المرتبة

$$\left\{ (n, (-1)^{n+1} n^2) : n \in \mathbb{N} \right\}$$

ملاحظات

(1) المتتابعات المذكورة في المثالين السابقين تسمى متتابعات غير منتهية أو لا نهائية لأنه لا يوجد حد أخير لأي منها، أي أنه يوجد بعد كل حد من حدودها حد آخر من حدود المتتابعة.

(2) المتتابعتان

$$\{a_n\} = -3, 0, 6, 12, 18$$

$$\{b_n\} = -1, 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23$$

كل منهما متتابعة منتهية لأن كل منهما لها حد أخير. لاحظ أن $\{a_n\} \neq \{b_n\}$

مثال 3: مثل المتتابعات التالية بيانياً:

$$a) \quad \{a_n\} = 2, 3, 4, 5, \dots, n+1, \dots$$


$$b) \quad \{b_n\} = \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{1}{n+1}, \dots$$

$$c) \quad \{c_n\} = -\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \dots, (-1)^n \frac{1}{n+1}, \dots$$


$$d) \quad \{d_n\} = 3, 3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

الحل:


المتتابعة $\{a_n\} = \{n+1\}$ ممثلة في الشكل التالي:




المتتابعة $\{b_n\} = \left\{ \frac{1}{n+1} \right\}$ ممثلة في الشكل التالي:



المتتابة $\{c_n\} = \left\{ (-1)^n \frac{1}{n+1} \right\}$ ممثلة في الشكل التالي:



المتتابعة $\{d_n\} = \{3\}$ ممثلة في الشكل التالي:



1.1 المتتابعات الحسابية

المتتابعة $\{a_n\}$ تسمى متتابعة حسابية إذا حققت الشرط التالي:

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = a_n + d \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

حيث a, d عدنان حقيقيان ثابتان، a : الحد الأول و d : الفرق العام للمتتابعة أو أساس المتتابعة الحسابية. ويعطى بالفارق بين حدين متعاقبين من حدود المتتابعة. من التعريف السابق نستنتج أن المتتابعة الحسابية حدودها هي:

$$a, a + d, a + 2d, a + 3d, \dots$$

$$a_1 = a, \quad \text{أي أن:}$$

$$a_2 = a_1 + d = a + d$$

$$a_3 = a_2 + d = a + 2d$$

$$a_4 = a_3 + d = a + 3d$$

و بالاستمرار بهذه الطريقة نستنتج أن الحد النوني a_n للمتتابعة الحسابية هو:

$$a_n = a + (n-1)d : n \in \mathbb{N}$$

مثال 4: المتتابعات التالية هي متتابعات حسابية:

a) 1, 2, 3, 4,, n, ...

متتابعة الأعداد الطبيعية حيث $a_1 = 1, d = 1$

b) 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31

متتابعة حسابية منتهية حيث $a_1 = 19, d = 2$

$$c) \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}, \dots$$

$$a_1 = \frac{1}{2}, d = -\frac{1}{6} \text{ متتابة حسابية حيث}$$

$$d) 5, 9, 13, 17, \dots$$

$$a_1 = 5, d = 4 \text{ هي متتابة حسابية غير منتهية حيث}$$

$$e) 1, -1, -3, -5, -7, \dots$$

$$a_1 = 1, d = -2 \text{ هي متتابة حسابية حيث}$$

مثال 5: أوجد قيمة الحد العشرين للمتتابة الحسابية:

$$1, -3, -7, -11, \dots$$

الحل:

$$a = 1, d = a_2 - a_1 = -3 - 1 = -4$$

في المتتابة السابقة نجد أن:

$$a_{20} = a + (n-1)d = 1 + (20-1)(-4) = 1 + 19(-4) = -75$$

ومنه:

مثال 6: متتابة حسابية فيها $a_{15} = -46$, $a_3 = 2$ أوجد a_{50} فيها

الحل:

$$a_3 = a + 2d = 2, \quad a_{15} = a + 14d = -46$$

لدينا:

$$-12d = 48 \Rightarrow d = -4$$

ب طرح المعادلتين نحصل على:

$$a - 8 = 2 \Rightarrow a = 10$$

بالتعويض في المعادلة الأولى نحصل على:

$$a_{50} = a + (n-1)d = 10 + 49(-4) = -186$$

ومنه:

مثال 7: مجموع ثلاثة أعداد تشكل متتابة حسابية يساوي 3- وحاصل ضربها يساوي 8. أوجد هذه

الأعداد.

الحل:

$$a_1 = a, a_2 = a + d, a_3 = a + 2d$$

لتكن:

$$\Rightarrow a_1 + a_2 + a_3 = a + (a + d) + (a + 2d) = 3a + 3d = -3$$

$$\Rightarrow a + d = -1 \quad (1)$$

$$a_1 a_2 a_3 = a(a + d)(a + 2d) = 8 \Rightarrow a(a + d)(a + d + d) = 8 \quad (2) \quad \text{ولدينا:}$$

$$-a(-1 + d) = 8 \Rightarrow a - ad = 8 \quad (3) \quad \text{نعوض (1) في (2) فيكون لدينا:}$$

$$a + d = -1 \Rightarrow d = -1 - a \quad (4) \quad \text{من (1) لدينا}$$

$$a - a(-1 - a) = 8 \Rightarrow a^2 + 2a - 8 = 0 \Rightarrow (a - 2)(a + 4) = 0 \quad \text{نعوض في المعادلة (3) فنحصل على:}$$

$$a = 2 \text{ أو } a = -4 \quad \text{ومنه:}$$

$$-4, -1, 2 \text{ هي والمتتابة هي } d = -1 - a = -1 + 4 = 3 \quad \text{إذا كان } a = -4 \text{ فإن:}$$

$$2, -1, 4 \text{ هي والمتتابة هي } d = -1 - a = -1 - 2 = -3 \quad \text{إذا كان } a = 2 \text{ فإن:}$$

$$2, -1, 4 \text{ أو } -4, -1, 2 \quad \text{إذن الأعداد الثلاثة هي:}$$

مثال 8: كم عدداً محصوراً بين 104 و 897 يقبل القسمة على 13

الحل:

$$a_1 = 104, a_n = 897 \quad \text{لتكن:}$$

$$a_n = a + (n - 1)d \Rightarrow 897 = 104 + 13(n - 1) \quad \text{لدينا:}$$

$$897 - 104 = 13n - 13 \Rightarrow 13n = 897 - 104 + 13 = 806 \Rightarrow n = \frac{806}{13} = 62 \quad \text{ومنه:}$$

وبالتالي عدد الحدود هو: 62

1.1.1 الأوساط الحسابية

الأوساط الحسابية بين العددين a, b هي الحدود الأخرى للمتتابة الحسابية التي حدها الأول a وحدها الأخير b . إذا كان a, b حدين من متتابة حسابية وبينهما وسط حسابي واحد فإننا نحصل على: a, c, b متتابة حسابية:

$$\Rightarrow c - a = b - c \Rightarrow c = \frac{a + b}{2}$$

مثال 9: أدخل 5 أوساط حسابية بين العددين: -13, 245

الحل:

بإدخال 5 أوساط حسابية بين -13, 245 نحصل على متتابة حسابية مكونة من 7 حدود حيث:

$$a = -13, a_7 = 245$$

$$a_7 = a + 6d \Rightarrow 245 = -13 + 6d \Rightarrow d = 43 \quad \text{لدينا:}$$

إذن الأوساط الحسابية هي:

$$-13 + 43, \quad -13 + 2(43), \quad -13 + 3(43), \quad -13 + 4(43), \quad -13 + 5(43)$$

$$30, 73, 116, 159, 202 \quad \text{أي:}$$

2.1. المتتابعات الهندسية

المتتابعة $\{s_n\}$ التي تحقق الشرط:

$$a_1 = a, \quad a_{n+1} = a_n \times r \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

حيث a, r عددان ثابتان تسمى متتابعة هندسية ويسمى العدد r النسبة العامة للمتتابعة أو أساس المتتابعة الهندسية. أساس المتتابعة الهندسية هو النسبة بين أي حدين متعاقبين في المتتابعة:

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \frac{a_4}{a_3} = \dots = \frac{a_n}{a_{n-1}}$$

من التعريف السابق نحصل على:

$$a_1 = a, \quad a_2 = a_1 \times r = ar, \quad a_3 = a_2 \times r = ar^2, \quad a_4 = a_3 \times r = ar^3$$

وبالاستمرار بهذه الطريقة نستنتج الحد النوني a_n للمتتابعة الهندسية:

$$a_n = ar^{n-1}$$

مثال 10: المتتابعات التالية هي متتابعات هندسية:

1) 3, 6, 12, 24, ...

متتابعة هندسية حيث الحد الأول $a = 3$ والأساس $r = 2$

2) 1, 4, 16, 64, ...

متتابعة هندسية حيث الحد الأول $a = 1$ والأساس $r = 4$

3) $-1, \frac{1}{3}, -\frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$

متتابعة هندسية حيث الحد الأول $a = -1$ والأساس $r = -\frac{1}{3}$

4) $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \frac{1}{27}, \dots$

متتابعة هندسية حيث الحد الأول $a = 1$ والأساس $r = \frac{1}{3}$

5) $8, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{8}, \dots$

متتابعة هندسية حيث الحد الأول $a = 8$ والأساس $r = \frac{1}{4}$

مثال 11: أوجد الحد العاشر في المتتابعة الهندسية التي حدها الأول يساوي 12.8 وحدها الثاني يساوي

6.4

الحل:

$$r = \frac{a_2}{a_1} = \frac{6.4}{12.8} = \frac{1}{2} \quad \text{والأساس } a = 12.8$$

$$a_n = ar^{n-1} \Rightarrow a_{10} = ar^9 = 12.8 \times \left(\frac{1}{2}\right)^9 = 0.25 \quad \text{الحد العاشر:}$$

$$\frac{1}{8}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \dots$$

مثال 12: أوجد الحد العاشر في المتتابعة الهندسية:

الحل:

$$r = \frac{1}{4} \div \frac{1}{8} = \frac{8}{4} = 2 \quad \text{والأساس } a = \frac{1}{8}$$

$$a_n = ar^{n-1} \Rightarrow a_{10} = ar^9 = \frac{1}{8} \times 2^9 = 64 \quad \text{الحد العاشر:}$$

$$27, 9, 3, \dots$$

مثال 13: أثبت أن $\frac{1}{243}$ هو أحد حدود المتتابعة:

الحل:

$$r = \frac{3}{9} = \frac{1}{3} \quad \text{والأساس } a = 27$$

$$a_n = ar^{n-1} \quad \text{بما أن } a_n = \frac{1}{243}$$

نفرض أن:

$$\frac{1}{243} = 27 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \Rightarrow \frac{1}{3^5} = 3^3 \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \Rightarrow \frac{1}{3^8} = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \Rightarrow \left(\frac{1}{3}\right)^8 = \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} \quad \text{إذن:}$$

إذا تساوت الأساسات تتساوى الأسس ومنه $8 = n - 1$

أي أن $n = 9$ وبذلك يكون $\frac{1}{243}$ هو الحد التاسع من حدود المتتابعة الهندسية السابقة.

1.2.1. الأوساط الهندسية

الأوساط الهندسية بين العددين a, b هي حدود المتتابعة الهندسية التي حدها الأول a ، وحدها الأخير b

إذا كان a, b حدين من متتابعة هندسية بينهما وسط هندسي واحد c فإن a, c, b متتابعة هندسية

$$\frac{c}{a} = \frac{b}{c} \Leftrightarrow c^2 = ab \Leftrightarrow c = \pm \sqrt{ab}$$

بفرض أن $ab > 0$ فإن:

$$-7, \frac{189}{8}$$

مثال 14: أدخل وسطين هندسيين بين:

الحل:

بإدخال الوسطين الهندسيين نحصل على متتابعة مكونة من 4 حدودها فيها $a = -7, a_4 = \frac{189}{8}$

$$a_n = ar^{n-1} \Rightarrow a_4 = \frac{189}{8} = -7r^3 \Leftrightarrow r^3 = \frac{-27}{8} = \left(\frac{-3}{2}\right)^3 \quad \text{لدينا:}$$

$$r = -\frac{3}{2} \quad \text{إذا تساوت الأسس تتساوى الأساسات ومنه:}$$

$$\frac{21}{2}, -\frac{63}{4} \text{ أي } (-7)\left(\frac{-3}{2}\right), (-7)\left(\frac{-3}{2}\right)^2 \quad \text{وتكون الأوساط الهندسية هي:}$$

تمارين

تمرين 1:

أ) في المسائل التالية اكتب الحدود الخمسة الأوائل لكل متتابعة ثم مثلها بيانياً:

$$1) \{2n+1\} \quad 2) \{n^2-1\} \quad 3) \{(-1)^n n\} \quad 4) \left\{\frac{1}{n(n+1)}\right\} \quad 5) \left\{\frac{1}{n}\right\}$$

ب) في المسائل التالية استنتج الحد النوني للمتتابعة بمعرفة الحدود الأربعة الأولى منها:

$$1) 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots \quad 2) 1, -1, 1, -1, \dots \quad 3) \frac{1}{2}, 0, -\frac{1}{2}, -1, \dots$$

$$4) a, ar, ar^2, ar^3, \dots \quad 5) a, a+d, a+2d, a+3d, \dots$$

ج) اكتب الحدود الخمسة الأوائل للمتتابعة $\left\{\frac{n}{n+1}\right\}$ ثم مثلها بيانياً.

تمرين 2:

(1) كم عدداً محصوراً بين 200 و 1350 ويقبل القسمة على 14.

(2) أدخل الأوساط المطلوبة فيما يلي:

أ) أربعة أعداد بين 32 و 243 بحيث تشكل مع هذين الحدين متتابعة هندسية.

ب) وسطاً حسابياً بين 73، - 83 بحيث يشكل مع هذين الحدين متتابعة هندسية.

ج) خمسة أعداد (أوساط حسابية بين العددين 4.25، - 2.25 بحيث تشكل الأعداد السبعة متتابعة حسابية.

د) وسطاً هندسياً بين 20، 5 بحيث يشكل مع هذين الحدين متتابعة هندسية.

(3) متتابعة حسابية حدها الرابع يساوي 18، وحدها السابع يساوي 27 أوجد الحد الثامن عشر فيها.

(4) متتابعة حسابية حدها الثامن ينقص عن حدها الثالث بمقدار 20، والحد الثالث ضعف الحد الثامن

فما هي المتتابعة وما قيمة كل من هذين الحدين؟

(5) اقترض شخص من بنك مبلغ 3600 دولار، على أن يسدده على 40 قسطاً تشكل متتابعة حسابية، ولكن الشخص توفي بعد أن دفع القسط الثلاثين وبقي عليه ثلث الدين، أوجد مقدار القسط الأول والأخير

(6) متتابعة هندسية حدها الرابع يساوي 64 وحدها السابع يساوي 8. فما هي المتتابعة؟

(7) متتابعة هندسية يزيد حدها الثالث عن حدها الثاني بمقدار 6 ويزيد حدها الرابع عن حدها الثاني بمقدار 18. فما هي هذه المتتابعة؟

الفصل الثاني : طرق العد

مقدمة

سننتظر في هذا الفصل إلى بعض طرق تحديد عدد النتائج الممكنة لتجربة ما أو عدد العناصر في مجموعة معينة بغير طريقة العد المباشر، وتسمى هذه الطرق بالتمثيل التوافقي.

1. القاعدة الأساسية للعد

(أ) إذا أجريت تجربة ما بعدد من الطرق مقدارها a وتجربة أخرى بعدد من الطرق مقدارها b فإن التجريبتين يمكن أن تحدثا معا بعدد من الطرق مقدارها: $a \times b$.

(ب) إذا كان لدينا عدة تجارب كل منها يمكن أن يحدث بعدد من الطرق مقدارها $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ على الترتيب فإن هذه التجارب يمكن أن تتم معا بعدد من الطرق مقدارها:

$$a_1 \times a_2 \times a_3 \times \dots \times a_n$$

مثال 1: أوجد عدد الطرق التي يمكن أن نرتب بها ثلاثة كتب مختلفة فوق المكتب.

الحل :

عدد الطرق التي يمكن أن نرتب بها الكتاب الأول ثلاثة طرق مختلفة إما من اليمين وإما على اليسار أو في الوسط، لنفرض أننا اخترنا مكان للكتاب الأول فإنه يبقى لنا مكانان وبالتالي فالكتاب الثاني يمكن أن نرتبه بطريقتين فقط، وإذا افترضنا أننا اخترنا مكانا للكتاب الثاني فإنه يبقى لدينا مكان واحد فقط وبالتالي فإن الكتاب الثالث يمكن أن نرتبه بطريقة واحدة فقط.

إذن عدد الطرق التي يمكن أن نرتب بها الكتب الثلاثة هي: $3 \times 2 \times 1 = 6$

1.1. مضروب n

حاصل ضرب الأعداد الطبيعية من 1 إلى n يسمى مضروب n Factorial n ويرمز له بالرمز $n!$

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times (n-2) \times (n-1) \times n$$

وهو عدد الطرق التي يمكن أن نرتب بها n من الأشياء

مثال 2: احسب ما يلي:

$$1! = 1, \quad 2! = 1 \times 2 = 2, \quad 3! = 1 \times 2 \times 3 = 6$$

$$4! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 = 24, \quad 5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120, \quad 6! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 = 720$$

يمكن كتابة $n!$ على الصورة التالية:

$$n! = n(n-1)! \quad \text{أو} \quad n! = [1.2.3... (n-1)].n = [(n-1)!] \times n$$

تسمى هذه المعادلة صيغة الاختزال لمضروب n

$$9! = 9(8!), \quad 23! = 23(22!)$$

إذن:

يمكن تطبيق هذه الصيغة لنحصل على:

$$n! = n(n-1)!$$

$$= n(n-1)(n-2)!$$

$$= n(n-1)(n-2)(n-3)!$$

وهكذا: $n! = n(n-1)(n-2)(n-3)(n-4)!$

إذا وضعنا $n=1$ في صيغة الاختزال نحصل على:

$$1 = 0! \quad \text{أو} \quad 1! = 1(0!)$$

$$0! = 1$$

لذلك يجب أن نعرف أن:

وذلك حتى تكون صيغة الاختزال صحيحة لجميع الأعداد الطبيعية بما فيها $n=1$

2. التباديل

لنعتبر مجموعة مكونة من n من الأشياء المختلفة فإن عدد طرق اختيار أشياء عددها r منها واحدا تلو الآخر دون إحلال (أي أن العنصر الأول لا يتم إرجاعه قبل اختيار الثاني، ولا يتم إرجاع العنصرين الأوليين قبل اختيار الثالث وهكذا.) يسمى الاختيار بهذه الطريقة تبديلاً Permutation أو اختياراً مرتباً. ونرمز له بالرمز ${}_n P_r$. ومنه فإنه يمكن اختيار العنصر الأول بطرق عددها n . ولكن حيث إنه لا يتم إحلال

العنصر الأول، فإنه يوجد عناصر عددها $n-1$ فقط من بينها يمكن اختيار العنصر الثاني. إذن العنصر الثاني يمكن اختياره بطرق عددها $n-1$. بالمثل، العنصر الثالث يمكن اختياره بطرق عددها $n-2$

حال اختيار العنصرين الأوليين، وهكذا العنصر الأخير (أي الرائي) يمكن اختياره بطرق عددها

$$n - (r - 1) = n - r + 1$$

إذن ${}_n P_r$ عدد التباديل لأشياء عددها r من بين أشياء عددها n يعطى بحاصل الضرب

$${}_n P_r = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$$

مثال 2: احسب ما يلي:

$${}_8 P_3 = 8(8-1)(8-2) = 8(7)(6) = 336$$

$${}_{15} P_2 = 15(15-1) = 15(14) = 210$$

$${}_4 P_2 = 4(4-1) = 4(3) = 12$$

يمكن التعبير عن ${}_n P_r$ باستخدام المضروب كما يلي:

$${}_n P_r = \frac{n!}{(n-r)!}$$

ملاحظة بوضع $r = n$ نحصل على النتيجة التالية

$${}_n P_n = \frac{n!}{(n-n)!} = \frac{n!}{0!} = n!$$

مثال 3: احسب ما يلي:

$$1) {}_8 P_3, \quad 2) {}_{15} P_2, \quad 3) {}_4 P_2$$

الحل:

$${}_8 P_3 = \frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

$${}_{15} P_2 = \frac{15!}{(15-2)!} = \frac{15!}{13!} = 15 \times 14 = 210$$

$${}_4 P_2 = \frac{4!}{(4-2)!} = \frac{4!}{2!} = 4 \times 3 = 12$$

مثال 4: بكم طريقة يمكن اختيار أشخاص للاشتراك في خمسة اختبارات مختلفة من مجموعة مكونة من ثمانية أشخاص؟

الحل:

الترتيب الذي يتم به اختيار الأشخاص الخمسة مهم جدا لأن جميع الاختبارات مختلفة. ومنه فإن عدد الطرق التي يمكن أن يتم بها الاختيار هو إذن عدد التباديل:

$${}_8 P_5 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4 = 6720$$

مثال 5: لنفرض أننا نريد اختيار ثلاثة أشخاص من بين أربعة للمشاركة في الاختبارات. بكم طريقة يمكن إجراء الاختيارات؟

الحل:

لنرمز للأفراد الأربعة بالحروف a, b, c, d . إذا كان الترتيب الذي يتم به الاختيار هام فإن عدد الاختيارات يساوي ${}_4 P_3 = 4 \times 3 \times 2 = 24$

ويمكننا عمل قائمة بالاختيارات الأربع والعشرين هذه كما يلي:

$abc, acb, bac, bca, cab, cba$

$abd, adb, bad, bda, dab, dba$

$acd, adc, cad, cda, dac, dca$

$bcd, bdc, cbd, cdb, dcb, dbc$

نلاحظ في هذه القائمة أن كل مجموعة من ثلاثة أشخاص تظهر ست مرات مناظرة للطرق الست المختلفة التي يمكن أن يتم بها ترتيب هذه العناصر الثلاث إذا كان الترتيب الذي يتم به اختيار الثلاث عناصر غير مهم، فإن كل هذه التباديل الست لكل مجموعة تكافئ كل منها الآخر، فعلى سبيل المثال، abc تكافئ acb أو bac ، وهكذا. عندما يكون الترتيب غير مهم فإن عدد الاختيارات المختلفة يساوي أربعة فقط مناظرة للصفوف الأربعة المكتوبة أعلاه.

3. التوافيق

إن اختيار عناصر عددها r من بين عناصر عددها n ، إذا كان ترتيب الاختيار غير مأخوذ في الاعتبار، يسمى كل اختيار من هذه الاختيارات توفيقاً لعناصر عددها r من عناصر عددها n ، وعدد التوافيق

$$\text{يرمز له بالرمز: } {}_n C_r = \binom{n}{r}$$

أي تبديل لعناصر عددها r من بين عناصر عددها n يمكن الحصول عليه بأن نقرر أولاً أي العناصر (عددها r) سنختار ثم نرتب هذه العناصر (عددها r) بترتيب مناسب.

عدد التباديل ${}_n P_r$ يكون إذن مساوياً لعدد طرق اختيار توافيق معينة لعناصر عددها r من بين عناصر عددها n مضروباً في عدد الطرق التي يمكن بها تنظيم كل توفيق بترتيب معين. أي أن،

$${}_n P_r = \binom{n}{r} \times N(r)$$

حيث $N(r)$ هو عدد التنظيمات المرتبة للعناصر المختارة وعددها r . ولكن $N(r)$ يجب أن يساوي $r!$ ${}_n P_r = r!$ أي عدد التباديل لعناصر عددها r من بين r عنصر.

$${}_n P_r = \binom{n}{r} r! \quad \text{إذن:}$$

$$\binom{n}{r} = \frac{{}_n P_r}{r!} = \frac{n!}{(n-r)!r!} \quad \text{وبالتالي فإن:}$$

يمكننا أيضا كتابة عدد التوافيق على الصورة:

$$\binom{n}{r} = \frac{n(n-1)\dots(n-r+1)}{r(r-1)\dots 2.1}$$

لاحظ أن كلا من البسط والمقام في هذا الكسر يحتوي على أعداد صحيحة متعاقبة عددها r كمعاملات.

مثال 6: احسب ما يلي:

$$1) \binom{8}{3} = \frac{8(8-1)(8-2)}{3(3-1)(3-2)} = \frac{8 \times 7 \times 6}{3 \times 2 \times 1} = 56, \quad 2) \binom{7}{5} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3}{5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21$$

في الحالة الأولى يوجد ثلاثة عوامل في كل من البسط والمقام، بينما في الحالة الثانية يوجد خمسة عوامل.

ملاحظات

هذه الخاصية الثانية يمكن تفسيرها كما يلي.

$$\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = 1.$$

$$\binom{n}{r} = \binom{n}{n-r} \quad \text{لجميع قيم } r$$

عندما يتم اختيار أي مجموعة من أشياء عددها r من بين أشياء عددها n ، فإن عدد الأشياء المتروكة دون اختيار يساوي $(n-r)$. عدد طرق اختيار أشياء عددها r يجب إذن أن يساوي عدد طرق تحديد الأشياء التي لن تختار وعددها $(n-r)$ ولكن يمكننا اختيار المجموعة المكونة من $(n-r)$ من العناصر بطرق عددها $\binom{n}{n-r}$ طريقة، وبالتالي فإن هذا يجب أن يساوي $\binom{n}{r}$ (يمكننا أيضا إثبات هذه النتيجة مباشرة باستخدام الصيغة التي تعبر عن $\binom{n}{r}$ بدلالة المضروبوات).

مثال 7: احسب ما يلي:

$$1) \binom{7}{5} = \binom{7}{7-5} = \binom{7}{2} = \frac{7 \times 6}{2 \times 1} = 21 \quad 2) \binom{50}{48} = \binom{50}{50-48} = \binom{50}{2} = \frac{50 \times 49}{2 \times 1} = 25 \times 49 = 1225$$

$$3) \binom{20}{17} = \frac{20!}{(20-17)!17!} = \frac{20 \times 19 \times 18 \times 17!}{3!17!} = \frac{20 \times 19 \times 18}{3 \times 2 \times 1} = 20 \times 19 \times 3 = 1140$$

$$4) \binom{16}{10} = \frac{16!}{(16-10)!10!} = \frac{16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11 \times 10!}{6!10!} = \frac{16 \times 15 \times 14 \times 13 \times 12 \times 11}{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1} = 8008$$

مثال 8: بكم طريقة يمكن اختيار 4 طلاب من بين 25 طالب لإرسالهم في بعثة دراسية ؟
الحل:

واضح هنا أن ترتيب الطلاب غير مهم وبالتالي عدد طرق الاختيارات يعطى بعدد التوافيق

$$\binom{25}{4} = \frac{25!}{(25-4)!4!} = \frac{25 \times 24 \times 23 \times 22 \times 21!}{21!4!} = \frac{25 \times 24 \times 23 \times 22 \times 21}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 12650$$

لنلخص كل النتائج السابقة أعلاه في النظرية التالية.

نظرية

اختيار عناصر عددها r من مجموعة معطاة مكونة من عناصر مختلفة عددها n ، فإن عدد:
أ) الاختيارات مع الإحلال تساوي n^r .

ب) الاختيارات بدون إحلال تساوي

$${}_n P_r = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

ج) التوافيق تساوي

$$\binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

مثال 9: إذا اختيرت ثلاث أوراق من مجموعة أوراق لعب مكونة من اثنتين وخمسين ورقة، واحدة فواحدة مع الإحلال. فكم عدد الاختيارات؟
الحل:

يمكن اختيار ثلاثة أوراق واحدة فواحدة مع الإحلال بطرق عددها:

$$n^r = 52 \times 52 \times 52 = 52^3$$

مثال 10: دخل خمسة أشخاص غرفة بها عشرة كراسي بكم طريقة يمكنهم الجلوس؟
الحل:

حيث إن الترتيب مهم فإن عدد الطرق يعطى بعدد التباديل ${}_{10} P_5$

$${}_{10} P_5 = \frac{10!}{(10-5)!} = \frac{10!}{5!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 \times 5!}{5!} = 10 \times 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 30240$$

مثال 11: كم عدد يمكن تكوينه من الأرقام 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 بحيث يكون كل عدد مركب من ثلاثة أرقام مختلفة؟

الحل:

كما في المثال السابق الترتيب مهم لأن مثلاً $123 \neq 132 \neq 231 \neq \dots$ فإن عدد الطرق يعطى بعدد التباديل ${}_7P_3$

$${}_7P_3 = \frac{7!}{(7-3)!} = \frac{7!}{4!} = \frac{7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4!} = 7 \times 6 \times 5 = 210$$

مثال 12: كيس يحتوي على 10 كرات. يراد سحب ثلاث كرات من الكيس واحدة بعد الأخرى، أوجد عدد الطرق التي يمكن أن نختار بها الكرات الثلاث.

(أ) السحب مع الإحلال (الإرجاع) (ب) السحب دون الإحلال

الحل:

(أ) السحب مع الإحلال

كل كرة يمكن اختيارها بطرق عددها 10 إذن عدد الطرق التي يمكن أن نختار بها الكرات الثلاث هي: $10^3 = 1000$

(ب) السحب دون الإحلال

الكرة الأولى يمكن اختيارها بطرق عددها 10، الكرة الثانية يمكن اختيارها بطرق عددها 9 و الكرة الثالثة يمكن اختيارها بطرق عددها 8. إذن عدد الطرق التي يمكن أن نختار بها الكرات الثلاث هي $10 \times 9 \times 8 = 720$ وهي عدد التباديل:

$${}_{10}P_3 = \frac{10!}{(10-3)!} = \frac{10!}{7!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7!}{7!} = 10 \times 9 \times 8 = 720$$

مثال 13: بكم طريقة يمكن اختيار طالبين من بين 8 طلاب لتكوين لجنة تشرف على النشاط الثقافي؟

الحل:

حيث أن الترتيب غير مهم فإن عدد الطرق التي يتم بها الخيارات تعطى بعدد التوافيق $\binom{8}{2}$

$$\binom{8}{2} = \frac{8!}{(8-2)!2!} = \frac{8 \times 7 \times 6!}{6!2!} = \frac{8 \times 7}{2} = 28$$

4. نظرية ذات الحدين

إذا كان n عدداً صحيحاً موجباً و a, b أعداد حقيقية فإن:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k = a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b^1 + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{r} a^{n-k} b^k + \dots + b^n$$

نماذج لمفكوك ذات الحدين لما $n = 1, n = 2, n = 3, n = 4$

$$(a + b) = a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

ملاحظات نلاحظ في هذه المفكوكات ما يلي:

(أ) عدد الحدود في كل مفكوك يزيد واحداً عن الأس في الطرف الأيمن.

(ب) الحد الأول في المفكوك هو العدد a مرفوعاً لنفس الأس في الطرف الأيمن، ثم ينقص الأس للعدد a في الحدود التالية بمقدار الوحدة في كل مرة.

(ج) العدد b يبدأ ظهوره في الحد الثاني، ثم يزيد أس العدد b بمقدار الوحدة على التوالي.

(د) مجموع الأسين للعددين a, b في أي حد من حدود المفكوك ثابت ويساوي الأس في الطرف الأيمن.

(هـ) معامل الحد الأول في المفكوك يساوي معامل الحد الأخير ويساوي الواحد، ومعامل الحد الثاني يساوي معامل الحد قبل الأخير وهكذا.

مثال 14: اكتب مفكوك $(a + b)^5$

الحل:

$$\begin{aligned} (a + b)^5 &= \sum_{k=0}^5 \binom{5}{k} a^{5-k} b^k = a^5 + \binom{5}{1} a^4 b^1 + \binom{5}{2} a^3 b^2 + \binom{5}{3} a^2 b^3 + \binom{5}{4} a b^4 + b^5 \\ &= a^5 + 5a^4 b^1 + 10a^3 b^2 + 10a^2 b^3 + 5ab^4 + b^5 \end{aligned}$$

مثال 15: اكتب مفكوك $(1 + 2b)^4$

الحل:

$$(1 + 2b)^4 = \sum_{k=0}^4 \binom{4}{k} (2b)^k = 1 + \binom{4}{1} 2b + \binom{4}{2} (2b)^2 + \binom{4}{3} (2b)^3 + (2b)^4$$

$$= 1 + \binom{4}{1} 2b + \binom{4}{2} 2^2 b^2 + \binom{4}{3} 2^3 b^3 + 2^4 b^4$$

$$= 1 + (4)2b + (6)2^2 b^2 + (4)2^3 b^3 + 2^4 b^4 = 1 + 8b + 24b^2 + 32b^3 + 16b^4$$

مثال 16: احسب قيمة $(1.03)^{10}$ مقربة لثلاثة أرقام عشرية

الحل:

لدينا: $1.03 = 1 + 0.03$ ومنه:

$$(1 + 0.03)^{10} = \sum_{k=0}^{10} \binom{10}{k} (0.03)^k = 1 + \binom{10}{1} \frac{3}{10^2} + \binom{10}{2} \left(\frac{3}{10^2}\right)^2 + \dots + \binom{10}{k} \left(\frac{3}{10^2}\right)^k + \dots + \left(\frac{3}{10^2}\right)^{10}$$

$$= 1 + \binom{10}{1} \frac{3}{10^2} + \binom{10}{2} \frac{3^2}{10^4} + \dots + \binom{10}{k} \frac{3^k}{10^{2k}} + \dots + \frac{3^{10}}{10^{20}}$$

$$= 1 + 0.03 + 0.0405 + 0.00324 + 0.0001701 + \dots \cong 1.3439101 \cong 1.344$$

توقفنا في الفك عند الحد الخامس لظهور ثلاثة أصفار عن يمين الفاصلة العشرية، حيث إن المطلوب التقريب لثلاثة أرقام عشرية.

مثال 17: اكتب الحد العاشر من مفكوك $\left(x^2 + \frac{1}{2x}\right)^{13}$ ، حيث $x \neq 0$

الحل:

$$\binom{13}{9} (x^2)^{13-9} \left(\frac{1}{2x}\right)^9 = \binom{13}{4} x^8 \frac{1}{2^9 x^9}$$

الحد العاشر هو:

$$= \frac{13 \times 12 \times 11 \times 10}{4 \times 3 \times 2 \times 1} \frac{1}{2^9 x} = \frac{715}{512} x^{-1}$$

تمارين

(1) احسب ما يلي:

1) ${}_{15}P_{12}$	4) ${}_{23}P_{18}$	7) ${}_{13}P_{10}$	10) ${}_{7}P_3 \times {}_{7}P_3$
2) ${}_{10}P_3 \div {}_{10}P_2$	5) ${}_{12}C_5$	8) ${}_{7}C_5$	11) ${}_{5}C_2 \times {}_{5}C_3$
3) ${}_{8}P_5 \div {}_{8}C_5$	6) ${}_{10}C_3 \div {}_{10}C_2$	9) ${}_{7}P_3 \times {}_{7}C_3$	12) ${}_{10}P_3 \div {}_{10}C_3$

(2) يحتوي كيس على عشر كرات.

(a) أوجد عدد الطرق التي يمكن بها سحب أربع كرات واحدة بعد الأخرى مع الإحلال.

(b) أوجد عدد الطرق التي يمكن بها سحب أربع كرات على التوالي ودون إرجاع.

(3) كم عددا من أربعة أرقام يمكن تكوينه من الأرقام: 1، 2، 3، 4، 5، 7، إذا كان:

(a) التكرار مسموح،

(b) التكرار غير مسموح، وبحيث يكون أي عدد أقل من 5000.

(4) يختار اللاعب في لعبة البوكر خمس ورقات من بين أوراق الشدة العادية (52 ورقة)

(a) بكم طريقة يمكن أن يحصل على أربع ورقات من النفس الرقم أو الصورة ؟

(b) بكم طريقة يمكن أن يحصل اللاعب على خمس ورقات متتالية بالترتيب ومن نفس

الشكل؟

(c) بكم طريقة يمكن أن يحصل اللاعب على خمس ورقات متتالية بالترتيب ولكنها ليست

من نفس الشكل ؟

(5) بكم طريقة يمكن تشكيل مجلس إدارة من خمسة أشخاص إذا كان لابد من اختيار شخص معين

في جميع الأحوال؟

(6) عرض عليك أحد العاملين بإحدى شركات التأمين عشر وثائق من وثائق تأمين السيارات ، بكم

طريقة يمكنك اختيار وثيقتين مختلفتين.

(7) يراد تكوين لجان في الكلية التقنية بالرياض، بحيث يكون بكل لجنة طالب من كل قسم

الأقسام

العشرة التي عدد الطلاب في كل منها 300. كم لجنة يمكن تكوينها؟

(8) 25 موظف في مؤسسة بها خمسة أبواب، بكم طريقة يمكنهم الدخول للمؤسسة؟

(9) حديقة عامة لها خمسة أبواب، بكم طريقة يستطيع فرد أن يدخل ويخرج

(a) من باب مختلف؟ (b) من أي باب؟

(10) استضاف رئيس شركة ثلاثة مسؤولين وأربعة عمال، وجلسوا للاجتماع على طاولة دائرية، بحيث يجلس المدير على كرسي معين، وبجانبه مسؤول فاعمل، وهكذا، بكم طريقة يمكن للمجموعة الجلوس؟

(11) ثماني نقاط كل ثلاث منها ليست على استقامة واحدة. كم قطعة مستقيمة يمكن رسمها بين هذه النقاط؟ وكم مثلثا يمكن تعيينه؟

(12) تسع قطع من العملات قذفت آنياً، فبكم طريقة يمكن أن تظهر بها 4 قطع متفقة في أحد الوجهين، بينما تتفق خمس في الوجه الآخر؟

(13) مجلس إدارة يتكون من 12 شخصاً، بكم طريقة يمكن أخذ قرار باتفاق 8 أعضاء ضد 4؟

(14) يراد تقسيم 10 كتب مختلفة بين طالبين a, b ، بحيث يعطى الأول 6 كتب، والثاني 4 كتب. بكم طريقة يتم هذا التقسيم؟

(15) أوجد مفكوك $(x + 2x^2)^7$.

(16) أوجد مفكوك $\left(1 + \frac{x}{y}\right)^5$ حيث $y \neq 0$

(17) أوجد الحد الحادي عشر من مفكوك $\left(\frac{1}{x} - \frac{x}{3}\right)^{15}$ ، حيث $x \neq 0$

(18) أوجد الحد التاسع من مفكوك $\left(\frac{x^2}{2} - \frac{8}{x}\right)^{17}$ ، حيث $x \neq 0$

(19) أوجد الحد الذي يحتوي على x^8 في مفكوك $(2x^2 - \frac{1}{2}y^3)$

المراجع

- 1) صلاح أحمد وإلهام حمصي وموفق دعبول، معجم الرياضيات المعاصرة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1403هـ - 1983م.
- 2) علي عبد الله الدفاع، نوابغ علماء العرب والمسلمين في الرياضيات، دار جون وايلي وأبناؤه، نيويورك، 1987م.
- 3) Gwyn Davies and Gordon Hick, Mathematics for scientific and technical students, Addison Wesley Longman, Harlow, England, 1998.
- 4) Anders Hald, A History of Probability and Statistics and Their Applications before 1750, John Wiley and Sons, New York, 1989.
- 5) Alexander Schrijver, Theory of Linear and Integer Programming, John Wiley & Sons, Chichester, England, 1986.
- 6) Seymour Lipschutz and Marc Lipson, Discrete Mathematics, McGraw-Hill, New York, 1997.
- 7) Peter Tebbutt, Basic Mathematics, John Wiley & Sons, Chichester, England, 1998.

المحتويات

1	الوحدة الأولى : المجموعات
4	الفصل الأول : المجموعات
4	1. تعريف المجموعة
4	رموز المجموعات وعناصرها
4	طرق تعريف المجموعات
5	المجموعة الجزئية
6	تساوي مجموعتين
6	المجموعة الشاملة والمجموعة الخالية
7	تمارين
8	2. العمليات على المجموعات
8	اتحاد مجموعتين
8	تقاطع مجموعتين
9	العلاقة بين الاتحاد والتقاطع (قانون التوزيع)
9	الفرق بين مجموعتين
10	متممة المجموعة
11	قانون دي مورغان
11	تمارين
13	الفصل الثاني : المجموعات العددية
13	1. مجموعات الأعداد
14	2. العمليات الحسابية على مجموعات الأعداد
14	العمليات الحسابية على N
14	العمليات الحسابية على Z
14	العمليات الحسابية على Q
20	تمارين

21	3. الأعداد الحقيقية
21	خط الأعداد الحقيقية
21	العمليات الحسابية على R
21	4. الفترات
21	الفترات المنتهية
23	الفترات غير المنتهية
24	5. القيمة المطلقة
25	تمارين
27	الوحدة الثانية : كثيرات الحدود
30	الفصل الأول : كثيرات الحدود
30	1. تعريف كثيرات الحدود
30	2. العمليات الحسابية على كثيرات الحدود
30	جمع وطرح كثيرات الحدود
31	ضرب كثيرات الحدود
32	حساب قيمة كثير حدود عند قيمة معينة للمتغير
32	قسمة كثيرات الحدود
34	تمارين
35	3. تحليل كثيرات الحدود
35	طريقة العامل المشترك الأكبر
36	طريقة تحليل كثير الحدود $ax^2 + bx + c$
37	طريقة تحليل فرق مربعين
38	تمارين
39	4. الكسور الجبرية
39	اختصار الكسور الجبرية
41	تمارين
43	الفصل الثاني : المعادلات
43	1. تعريف المعادلات

44	2. حل المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد
45	تمارين
46	3. حل المعادلات من الدرجة الثانية
46	طريقة التحليل
46	طريقة الجذر التربيعي
47	طريقة المميز
49	تمارين
51	الوحدة الثالثة : الدوال الأسية واللوغاريتمية
54	1. الأسس
58	2. الدوال الأسية
60	3. الدوال اللوغاريتمية
65	4. المعادلات الأسية واللوغاريتمية
67	تمارين
70	الوحدة الرابعة: مفهوم الدالة ومنحنائها
73	1. تعريف الدالة
77	2. الدوال العددية
79	3. الدوال الجبرية
83	3. الدوال غير الجبرية
85	تمارين
86	الوحدة الخامسة : طرق العد والمتتابعات
89	الفصل الأول: المتتابعات
89	1. المتتابعات
93	المتتابعات الحسابية
96	المتتابعات الهندسية
98	تمارين
100	الفصل الثاني: طرق العد
100	1. القاعدة الأساسية للعد

101

2. التباديل

103

3. التوافيق

107

4. نظرية ذات الحدين

109

تمارين

111

المراجع

